

Günter Bärwolff

Höhere Mathematik
für Naturwissenschaftler und Ingenieure

Aufgabenlösungen und Erratum

unter Mitarbeit von
Gottfried Seifert

Mai 2006

Aufgabenlösungen

Nachfolgend sind die Lösungen der in der zweiten Auflage der Monographie "Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure" gestellten Aufgaben kapitelweise zu finden. Um die Lösungsschritte nachvollziehbar zu machen, wurden die einzelnen Aufgabenlösungen möglichst umfangreich behandelt. Daran anschließend sind evtl. vor dem Druck übersehene Fehler angegeben und korrigiert.

Kapitel 1

1) Nachweis mit vollständiger Induktion

Induktionsanfang $n = 2$

$(1 + a_1)(1 + a_2) = 1 + a_1 + a_2 + a_1a_2 > 1 + a_1 + a_2$, da $a_1a_2 > 0$ ist.

Induktionsschritt $n \implies n + 1$

Die Aussage gelte für festes n . Die Gültigkeit für $n + 1$ ist zu zeigen.

$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) > 1 + (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \implies$

$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)(1 + a_{n+1}) > [1 + (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)](1 + a_{n+1}) =$

$1 + (a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}) + a_1a_{n+1} + \cdots + a_na_{n+1} > 1 + (a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1})$,

da $a_1a_{n+1} + \cdots + a_na_{n+1} > 0$ ist.

Damit ist der Induktionsbeweis erbracht.

2) Nachweis mit vollständiger Induktion

Induktionsanfang $n = 2$

$(1 - a_1)(1 - a_2) = 1 - (a_1 + a_2) + a_1a_2 > 1 - (a_1 + a_2)$, da $a_1a_2 > 0$ ist.

Induktionsschritt $n \implies n + 1$

Die Aussage gelte für festes n . Die Gültigkeit für $n + 1$ ist zu zeigen.

$(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) > 1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \implies$

$(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)(1 - a_{n+1}) > [1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)](1 - a_{n+1}) =$

$1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}) + a_1a_{n+1} + \cdots + a_na_{n+1} > 1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1})$,

da $a_1a_{n+1} + \cdots + a_na_{n+1} > 0$ ist.

Damit ist der Induktionsbeweis erbracht.

3) Falls $a > 0$ ist, ergibt sich die Beziehung bei $n = 2$ als Spezialfall $a_k = a$, $k = 1, \dots, n$, von Aufgabe 1). Falls $-1 < a < 0$ gilt, erhält man die Ungleichung für $n \geq 2$ als Spezialfall $a_k = -a$, $k = 1, \dots, n$, von Aufgabe 2). Die Fälle $n = 0, 1$ ($a > -1$) und $a = 0$ ($n = 0, 1, \dots$) sind unmittelbar klar.

4) Nachweis mit vollständiger Induktion

Induktionsanfang $n = 0$

$1 = \frac{1 - a^{0+1}}{1 - a} = 1$.

Induktionsschritt $n \implies n + 1$

Die Aussage gelte für festes n . Die Gültigkeit für $n + 1$ ist zu zeigen.

$1 + a + a^2 + \cdots + a^n + a^{n+1} = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} + a^{n+1} =$

$= \frac{1 - a^{n+1} + a^{n+1}(1 - a)}{1 - a} = \frac{1 - a^{n+1} + a^{n+1} - a^{n+2}}{1 - a} = \frac{1 - a^{n+2}}{1 - a}$.

Damit ist der Induktionsbeweis erbracht.

5) Lösungsmenge der Ungleichung $|x - 5| < \frac{1}{x}$, kritische Punkte $x = 0$, $x = 5$

a) $x \geq 5$: $|x - 5| < \frac{1}{x} \iff (x - 5)x = x^2 - 5x < 1 \iff$

$x^2 - 5x - 1 = (x - \frac{5 + \sqrt{29}}{2})(x - \frac{5 - \sqrt{29}}{2}) < 0 \iff \frac{5 - \sqrt{29}}{2} < 5 \leq x < \frac{5 + \sqrt{29}}{2}$

b) $0 < x < 5$: $|x - 5| < \frac{1}{x} \iff -(x - 5)x = -x^2 + 5x < 1 \iff$

$x^2 - 5x + 1 = (x - \frac{5 + \sqrt{21}}{2})(x - \frac{5 - \sqrt{21}}{2}) > 0 \iff 0 < x < \frac{5 - \sqrt{21}}{2} \vee \frac{5 + \sqrt{21}}{2} < x < 5$

c) $x < 0$: $|x - 5| < \frac{1}{x} \iff -(x - 5)x = -x^2 + 5x > 1 \iff$

$x^2 - 5x + 1 < 0 \iff (x - \frac{5 + \sqrt{21}}{2})(x - \frac{5 - \sqrt{21}}{2}) < 0 \iff$ für kein $x < 0$ erfüllt.

Lösungsmenge:

$$L =]0, \frac{5 - \sqrt{21}}{2}[\cup]\frac{5 + \sqrt{21}}{2}, \frac{5 + \sqrt{29}}{2}[.$$

6) Die Ungleichung $x^2 + 6x + 2 > 0$ ist wegen

$$x^2 + 6x + 2 = (x - (-3 + \sqrt{7}))(x - (-3 - \sqrt{7})) \text{ für } x < -3 - \sqrt{7} \vee -3 + \sqrt{7} < x$$

erfüllt. Die Ungleichung $|x + 3| \leq 4$ ist für $x \in [-7, 1]$ erfüllt.

Lösungsmenge des Systems:

$$L = (] - \infty, -3 - \sqrt{7}[\cup] -3 + \sqrt{7}, \infty[) \cap [-7, 1] = [-7, -3 - \sqrt{7}[\cup] -3 + \sqrt{7}, 1].$$

7) Gegeben $z = \frac{e^{i\frac{\pi}{2}} + 3 - 5i}{2 - i}$, es ist $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$

$$z = \frac{(2 + i)(i + 3 - 5i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{1}{5}[(2 + i)(3 - 4i)] = \frac{(2 + i)(3 - 4i)}{5} = \frac{6 + 3i - 8i + 4}{5} = 2 - i.$$

8) Gegeben $z = e^{i\frac{5\pi}{6}} + \frac{2-i}{1+i}$, es ist $e^{i\frac{5\pi}{6}} = \cos(\frac{5\pi}{6}) + i \sin(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$

$$z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} + \frac{2 - 3i - 1}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} - i.$$

9) Gegeben $z = 2 + 2\sqrt{3}i$, $|z| = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$

$$\text{Arg } z = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{2} = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3} \implies z = 2 + 2\sqrt{3}i = 4e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

10) Zu lösen ist $z^4 = i$, $i = e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$z_k = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)/4} = e^{i(\frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

11) Man findet mit $z = -2$ eine Nullstelle von $p(z)$. Die Nullstellen von $p(z)$ bilden ein regelmäßiges Fünfeck und liegen auf einem Kreis mit dem Radius 2 um den Ursprung. Es ist $z^5 = -32 = 32e^{i\pi}$ zu lösen; mit der DE MOIVRESchen Formel findet man

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{5} + k\frac{2\pi}{5})} = 2\cos(\frac{\pi}{5} + k\frac{2\pi}{5}) + i2\sin(\frac{\pi}{5} + k\frac{2\pi}{5}), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4,$$

und damit die Linearfaktoren $(z - z_k)$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$, mit $p(z) = \prod_{k=0}^4 (z - z_k)$. Konkret ergeben sich die Linearfaktoren

$$(z - (2\cos\frac{\pi}{5} + i2\sin\frac{\pi}{5})), \quad (z - (2\cos\frac{3\pi}{5} + i2\sin\frac{3\pi}{5})), \quad (z - (2\cos\frac{5\pi}{5} + i2\sin\frac{5\pi}{5})), \\ (z - (2\cos\frac{7\pi}{5} + i2\sin\frac{7\pi}{5})), \quad (z - (2\cos\frac{9\pi}{5} + i2\sin\frac{9\pi}{5})),$$

wobei der dritte Linearfaktor $(z - (-2)) = z + 2$ die Nullstelle $z = -2$ enthält.

12) Es gilt $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ und damit

$$(\cos x + i \sin x)^3 = (e^{ix})^3 = e^{i3x} = \cos 3x + i \sin 3x.$$

Man erhält nun

$$\begin{aligned} (\cos x + i \sin x)^3 &= (\cos^2 x + 2i \cos x \sin x - \sin^2 x)(\cos x + i \sin x) \\ &= \cos^3 x + 2i \cos^2 x \sin x - \sin^2 x \cos x + i \cos^2 x \sin x - 2 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x \\ &= \cos^3 x - \sin^2 x \cos x - 2 \cos x \sin^2 x + i(2 \cos^2 x \sin x + \cos^2 x \sin x - \sin^3 x) \\ &= 4 \cos^3 x - 3 \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x + i(3 \cos^2 x \sin x + 3 \sin^3 x - 4 \sin^3 x) \\ &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x + i(3 \sin x - 4 \sin^3 x), \end{aligned}$$

und damit durch Vergleich von Real- und Imaginärteil die zu beweisenden Beziehungen.

Kapitel 2

1) Für die Folge (a_n) ergibt sich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{4}{3 + \frac{4}{n} + \frac{25}{n^2}} + \frac{\sqrt{3}}{3n^2 + 4n + 25} \right] = \frac{4}{3}.$$

Es gilt $-\frac{1}{n} < \frac{\sin(n^3)}{n} < \frac{1}{n}$ und damit wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ auch $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$. Für die Folge (d_n) gilt

$$0 < d_n = \frac{n}{1 + n + \frac{n^2}{2!} + \frac{n^3}{3!} + \dots} < \frac{n}{1 + n + \frac{n^2}{2!}}$$

und aus $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1 + n + \frac{n^2}{2!}} = 0$ folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$.

Zur Berechnung des Grenzwertes der Folge (b_n) berechnen wir hilfsweise den Grenzwert der Funktion $f(x) = \sqrt{x+4}$, also

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+4} = \lim_{x \rightarrow \infty} (x+4)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x} \ln(x+4)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln(x+4)} = e^0 = 1.$$

Dabei haben wir die Stetigkeit der Exponentialfunktion und $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln(x+4) = 0$ (Regel von BERNOULLI-L'HOSPITAL) genutzt. Damit folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

2) Mit der Regel von BERNOULLI-L'HOSPITAL ergibt sich

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x + \sqrt{x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right] = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^3)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 \cos(x^3)}{2x} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{-1} = 1. \end{aligned}$$

3) Für die Ableitungen (in den jeweiligen Definitionsbereichen) ergibt sich

$$\begin{aligned} f'_1(x) &= \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}, \\ f'_2(x) &= (x^{x^2})' = (e^{x^2 \ln x})' = (e^{x^2 \ln x})(x^2 \ln x)' = x^{x^2}(2x \ln x + x), \\ f'_3(x) &= \frac{(e^x + xe^x) \arctan x - \frac{xe^x}{1+x^2}}{\arctan^2 x} = \frac{e^x(1+x)}{\arctan x} - \frac{xe^x}{(1+x^2) \arctan^2 x}, \\ f'_4(x) &= \frac{3}{2} \sqrt{x} \cos x - x\sqrt{x} \sin x. \end{aligned}$$

4) Für die Ableitungen von $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ erhält man

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad f'(0) = 0, \quad f''(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}, \quad f''(0) = 1, \\ f'''(x) &= -3x(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}. \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich das TAYLOR-Polynom

$$T_2(x) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad \text{und das Restglied} \quad R_2(x) = -3\xi(1+\xi^2)^{-\frac{5}{2}} \frac{x^3}{6} \quad (0 \leq \xi \leq \frac{1}{5}).$$

Für $x \in [0, \frac{1}{5}]$ gilt die Abschätzung

$$|R_2(x)| = \left| \xi(1+\xi^2)^{-\frac{5}{2}} \frac{x^3}{2} \right| \leq \frac{1}{5} \frac{1}{125} \frac{1}{2} = \frac{1}{1250}.$$

5) Für die Krümmung erhält man

$$\kappa(x) = \frac{6x^{-4}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x^6}}^3} = \frac{6}{x^4 \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}}}.$$

Die Krümmung wird maximal, wenn der Nenner $n(x) = x^4 \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}}$ minimal wird. Für die Ableitung ergibt sich

$$n'(x) = (x^4 \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}})' = 4x^3(1 + \frac{4}{x^6})\sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} - x^4 \frac{3}{2} \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} \frac{24}{x^7} = x^3 \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} (4 - \frac{20}{x^6})$$

mit der nichttrivialen Nullstelle $x_0 = \sqrt[6]{5}$. Für die 2. Ableitung des Nenners errechnet man

$$\begin{aligned} n''(x) &= [\sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} (4x^3 - \frac{20}{x^3})]' = \frac{1}{2\sqrt{1 + \frac{4}{x^6}}} (-\frac{24}{x^7}) + \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} (12x^2 + \frac{60}{x^4}) \\ &= -12 \frac{\sqrt{1 + \frac{4}{x^6}}}{(1 + \frac{4}{x^6})x^7} (4x^3 - \frac{20}{x^3}) + \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} (12x^2 + \frac{60}{x^4}) = \dots \\ &= \sqrt{1 + \frac{4}{x^6}} [12x^2 + \frac{60}{x^4} + \frac{240}{x^{10} + 4x^4} - \frac{48x^2}{x^6 + 4}]. \end{aligned}$$

Für $x = x_0$ ergibt sich

$$n''(x_0) = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} 20 \sqrt[3]{5} > 0,$$

also wird die Krümmung an der Stelle $x_0 = \sqrt[6]{5}$ maximal.

6) Es ergeben sich folgende Stammfunktionen

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{x^2 + 2x - 1} dx &= \int [x - 2 + \frac{5x - 2}{x^2 + 2x - 1}] dx \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{5}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x - 1} dx - \int \frac{7}{x^2 + 2x - 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{5}{2} \ln|x^2 + 2x - 1| - \int \frac{7}{(x - (-1 + \sqrt{2}))(x - (-1 - \sqrt{2}))} dx \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{5}{2} \ln|x^2 + 2x - 1| - \frac{7}{2\sqrt{2}} [\int [\frac{1}{x - (-1 + \sqrt{2})} - \frac{1}{x - (-1 - \sqrt{2})}] dx] \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{5}{2} \ln|x^2 + 2x - 1| - \frac{7}{2\sqrt{2}} \ln|\frac{x - (-1 + \sqrt{2})}{x - (-1 - \sqrt{2})}| + \text{const.} . \\ \int e^{3x} \cos x dx &= e^{3x} \sin x - \int 3e^{3x} \sin x dx \\ &= e^{3x} \sin x - 3[-e^{3x} \cos x - \int 3e^{3x} (-\cos x) dx] \\ &= e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x - 9 \int e^{3x} \cos x dx \implies \\ \int e^{3x} \cos x dx &= \frac{1}{10} [e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x] + \text{const.} \end{aligned}$$

Die Substitution $t = \tan \frac{x}{2}$ ergibt

$$\int \frac{1}{\cos x + \sin x + 1} dx = \int \frac{2}{2t + 2} dt = \ln |t + 1| + \text{const.} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + \text{const.}$$

7) Die Funktion $f(x) = x^3$ hat im Intervall $[0, \pi]$ die auf dem Intervall $[0, \pi^3]$ definierte Umkehrfunktion $g(y) = \sqrt[3]{y}$, so dass sich das Volumen des Rotationskörpers zu

$$V = \pi \int_0^{\pi^3} (\sqrt[3]{y})^2 dy = \pi \frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} \Big|_0^{\pi^3} = \frac{3}{5} \pi^6$$

ergibt.

8) Für die Mantelfläche ergibt sich

$$F = 2\pi \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{4 - x^2}} dx = 2\pi \int_0^2 2 dx = 8\pi$$

und zusammen mit der Deckfläche $D = 2^2\pi$ erhält man für die gesamte Oberfläche den Wert von 12π (hier kann man den Wert auch direkt durch Kenntnis der Oberfläche einer Halbkugel angeben, sofern man die Formel parat hat).

9) Das Integral $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^4} dx$ konvergiert, da wir die Konvergenz des Integrals $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx$ nachgewiesen haben und $\frac{1}{1+x^2}$ für $x \geq 1$ eine konvergente Majorante von $\frac{1}{1+x^4}$ ist. Den Wert des Integrals kann man über die Stammfunktionsberechnung mit einer Partialbruchzerlegung erhalten. Möglich ist aber die Nutzung der Residuensatzes (s. dazu Kapitel 10). Für das Integral $\int_1^2 \frac{1}{x^2-1} dx$ ergibt sich mit $0 < \epsilon (< 1)$

$$\int_{1+\epsilon}^2 \frac{1}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int_{1+\epsilon}^2 \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right] dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \Big|_{1+\epsilon}^2 = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \ln \frac{\epsilon}{2+\epsilon}.$$

Wegen $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \ln \frac{\epsilon}{2+\epsilon} = -\infty$ konvergiert das Integral nicht.

Das Integral

$$\int_0^\infty \frac{\cos^2 x}{1+x^3} dx = \int_0^1 \frac{\cos^2 x}{1+x^3} dx + \int_1^\infty \frac{\cos^2 x}{1+x^3} dx$$

konvergiert, da

$$\frac{\cos^2 x}{1+x^3} \leq \frac{1}{1+x^2} \quad \text{für } x \in [1, \infty[$$

gilt, d.h. wir haben mit $\frac{1}{1+x^2}$ eine konvergente Majorante gefunden (der Summand $\int_0^1 \frac{\cos^2 x}{1+x^3} dx$ ist unkritisch, da es sich um ein bestimmtes Integral einer stetigen Funktion handelt).

10) Zur Berechnung von $\sqrt{5}$ wird eine Nullstelle der Funktion $f(x) = x^2 - 5$ gesucht. Das NEWTON-Verfahren ergibt die Rekursionsfolge

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 5}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{5}{x_n} \right)$$

zur Bestimmung einer Nullstelle von $f(x) = x^2 - 5$.

11) Für die LAGRANGE-Basispolynome L_1, L_2, L_3 erhält man (L_0 spielt wegen $y_0 = 0$ keine

Rolle)

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-5)}{(2-1)(2-3)(2-5)} = \frac{1}{3}(x-1)(x-3)(x-5),$$

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-5)}{(3-1)(3-2)(3-5)} = -\frac{1}{4}(x-1)(x-2)(x-5),$$

$$L_3(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(5-1)(5-2)(5-3)} = \frac{1}{24}(x-1)(x-2)(x-3),$$

so dass sich das LAGRANGE-Polynom

$$\begin{aligned} p_3(x) &= 0 \cdot L_0(x) + 3 \cdot \frac{1}{3}(x-1)(x-3)(x-5) - 2 \cdot \frac{1}{4}(x-1)(x-2)(x-5) + 1 \cdot \frac{1}{24}(x-1)(x-2)(x-3) \\ &= (x-1)(x-3)(x-5) - \frac{1}{2}(x-1)(x-2)(x-5) + \frac{1}{24}(x-1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

ergibt.

12) Das Steigungsschema von Seite 184 wird geeignet erweitert zu

$x_{i+3} - x_i$	$x_{i+2} - x_i$	$x_{i+1} - x_i$	x_i	$[x_i] = y_i$	Δ	$[x_{i+1}, x_i]$	Δ	$[x_{i+2}x_{i+1}x_i]$	Δ	$[x_3x_2x_1x_0]$
		1	1	<u>3</u>						
		1			-1	<u>-1</u>				
	2		2	2			5	<u>2,5</u>		
3		1			4	4			-7	<u>-7/3</u>
	2		3	6			-9	<u>-4,5</u>		
		1			-5	-5				
			4	1						

und man erhält

$$[x_0] = 3, \quad [x_1x_0] = -1, \quad [x_2x_1x_0] = 2,5, \quad [x_3x_2x_1x_0] = -\frac{7}{3}.$$

Damit erhält man das NEWTONsche Interpolationspolynom

$$\begin{aligned} p_2(x) &= [x_0] + [x_1x_0](x-x_0) + [x_2x_1x_0](x-x_0)(x-x_1) + [x_3x_2x_1x_0]((x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)) \\ &= 3 - (x-1) + 2,5 \cdot (x-1)(x-2) - \frac{7}{3}(x-1)(x-2)(x-3). \end{aligned}$$

Kapitel 3

1) Man findet aufgrund der Berechnungsformel für den Wert einer geometrischen Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = 4 \text{ und damit } \sum_{k=3}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k = 4 - \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{9}{16}\right) = \frac{27}{16}.$$

2) Es gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right] = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

mit $s_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1}$. Damit ergibt sich

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1.$$

3) Man erhält

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^k (k+1)!}{2^{k+1} k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{2} = \infty,$$

also konvergiert die Reihe für alle $x \in]-\infty, \infty[$.

4) Wegen

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{2-i}{1-i} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{10}}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2},$$

konvergiert die Reihe für alle z mit $|z - i| < \frac{\sqrt{10}}{2}$. Der Konvergenzkreis ist ein Kreis mit dem Radius $\frac{\sqrt{10}}{2}$ und dem Mittelpunkt $z_0 = i$ in der komplexen Zahlenebene.

5) Für den Konvergenzradius ρ gilt $6 \geq \rho \geq 4$, weil die Reihe für $x = -4$ divergiert, also $|-4 - 2| = 6 \geq \rho$ gilt, und weil die Reihe für $x = -2$ konvergiert, also $|-2 - 2| = 4 \leq \rho$ gilt. Deshalb liegt im Intervall $[-2, 6[$ Konvergenz, und in den Intervallen $]-\infty, -4]$ und $]8, \infty[$ Divergenz vor.

6) Die arctan-Reihe

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

ist für $x = 1$ konvergent, so dass $\frac{\pi}{4} = \arctan 1 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \mp \dots$ gilt. Die geforderte Genauigkeit erreicht man in jedem Fall, wenn

$$\left| (-1)^k \frac{1}{2(n+1)+1} \right| = \frac{1}{2n+3} < 10^{-5} \quad \text{also} \quad n > \frac{10^5 - 3}{2}$$

gilt, also jedenfalls für n größer als 50000.

7) Die ungerade 2π -periodische Fortsetzung ergibt

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{\pi}(\pi x - x^2) & x \in [0, \pi] \\ \frac{4}{\pi}(\pi x + x^2) & x \in [-\pi, 0] \end{cases}.$$

Die Koeffizienten a_k sind gleich Null und für die Koeffizienten b_k , $k \geq 1$, ergibt sich $b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{4}{\pi} (\pi x - x^2) \sin kx \, dx$. Mit den Stammfunktionen

$$\begin{aligned} \int x \sin kx \, dx &= -\frac{x \cos kx}{k} + \frac{\sin kx}{k^2} \\ \int x^2 \sin kx \, dx &= -\frac{x^2 \cos kx}{k} + \frac{2x \sin kx}{k^2} + \frac{2 \cos kx}{k^3} \end{aligned}$$

ergeben sich die Koeffizienten

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{8}{\pi} \left[-\frac{x \cos kx}{k} + \frac{\sin kx}{k^2} \right]_0^\pi - \frac{8}{\pi^2} \left[-\frac{x^2 \cos kx}{k} + \frac{2x \sin kx}{k^2} + \frac{2 \cos kx}{k^3} \right]_0^\pi \\ &= \frac{16}{\pi^2 k^3} [1 - (-1)^k] \end{aligned}$$

und damit die FOURIER-Reihe

$$f(x) = \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^k}{k^3} \sin kx = \frac{32}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{(2k-1)^3}.$$

8) Mit der Stammfunktion $\int x \sin kx \, dx$ aus der vorigen Aufgabe erhält man für die FOURIER-Koeffizienten b_k , $k \geq 1$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin kx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos kx}{k} + \frac{\sin kx}{k^2} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin k \frac{\pi}{2}}{k^2} - \frac{\sin(k(-\frac{\pi}{2}))}{k^2} \right] = \frac{4}{\pi} \frac{\sin k \frac{\pi}{2}}{k^2}. \end{aligned}$$

Damit erhält man die FOURIER-Reihe

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k \frac{\pi}{2}}{k^2} \sin kx \\ &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin[(2n-1)\frac{\pi}{2}]}{(2n-1)^2} \sin[(2n-1)x] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} \sin[(2n-1)x]. \end{aligned}$$

Für $x = \frac{\pi}{2}$ ergibt sich daraus

$$\frac{\pi}{2} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} \sin[(2n-1)\frac{\pi}{2}] = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2} (-1)^{n-1} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

bzw. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. Aus der PARSEVALSchen Gleichung folgt mit

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f^2(x) \, dx = \frac{\pi^2}{6}$$

die Beziehung

$$\frac{\pi^2}{6} = \frac{16}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} \quad \text{und damit} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

Kapitel 4

1) Die Determinanten der Matrizen A und B sind mit $\det(A) = 1$ und $\det(B) = 1+a+b-2ab$ mit der SARRUSSchen Regel leicht zu berechnen. Bei der Matrix C erkennt man, dass in den Spalten die 0-te, 1-te, 2-te und 3-te Potenz der Zahlen $w = 1, x = 2, y = 3, z = 4$ steht, also

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & w & w^2 & w^3 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & y & y^2 & y^3 \\ 1 & z & z^2 & z^3 \end{pmatrix}.$$

Die Determinanten solcher Matrizen nennt man VANDERMONDESche Determinanten, die die allgemeine Form

$$V = \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \dots & x_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \tag{1}$$

haben. Man findet nun

$$\begin{aligned} \det(C) &= \begin{vmatrix} 1 & w & w^2 & w^3 \\ 0 & x-w & x^2-w^2 & x^3-w^3 \\ 0 & y-w & y^2-w^2 & y^3-w^3 \\ 0 & z-w & z^2-w^2 & z^3-w^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-w & x^2-w^2 & x^3-w^3 \\ y-w & y^2-w^2 & y^3-w^3 \\ z-w & z^2-w^2 & z^3-w^3 \end{vmatrix} \\ &= (x-w)(y-w)(z-w) \begin{vmatrix} 1 & x+w & x^2+xw+w^2 \\ 1 & y+w & y^2+yw+w^2 \\ 1 & z+w & z^2+zw+w^2 \end{vmatrix} \\ &= (x-w)(y-w)(z-w) \begin{vmatrix} 1 & x+w & x^2+xw+w^2 \\ 0 & y-x & y^2-x^2+yw-xw \\ 0 & z-x & z^2-x^2+zw-xw \end{vmatrix} \\ &= (x-w)(y-w)(z-w) \begin{vmatrix} y-x & y^2-x^2+yw-xw \\ z-x & z^2-x^2+zw-xw \end{vmatrix} \\ &= (x-w)(y-w)(z-w)(y-x)(z-x) \begin{vmatrix} 1 & y+x+w \\ 1 & z+x+w \end{vmatrix} \\ &= (x-w)(y-w)(z-w)(y-x)(z-x)(z-y) \end{aligned}$$

und damit $\det(C) = (2-1)(3-1)(4-1)(3-2)(4-2)(4-3) = 12$. Für die Determinante (1) erhält man auf die gleiche Weise

$$V = \prod_{\substack{i,j=1 \\ i>j}}^n (x_i - x_j).$$

2) Es gilt

$$\det(B) \begin{cases} = 0 & \text{für } b \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}, a = \frac{b+1}{2b-1} \\ \neq 0 & \text{für } b = \frac{1}{2}, a \text{ beliebig, oder } b \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}, a \neq \frac{b+1}{2b-1} \end{cases}.$$

3) Für das Gleichungssystem $A_1 \mathbf{x} = \mathbf{b}_1$ findet man nach 3 Schritten des GAUSSSchen Algorithmus

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \iff \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

damit ist das Gleichungssystem lösbar und die Lösung hat die Form

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Für das Gleichungssystem $A_2\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$ ergibt sich

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 2 & | & 3 \\ -1 & 2 & -1 & -2 & | & -3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & | & 5 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & | & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & | & 5 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 5 & | & 13 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 2 & | & 3 \\ 0 & 2 & -1 & -2 & | & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 13 & | & 13 \end{pmatrix}$$

und damit die Lösung $\mathbf{x} = (0,0,1,1)^T$.

4) Die Matrix A hat das charakteristische Polynom $\chi_A(\lambda) = -\lambda^3 + 4\lambda^2 - 3\lambda$ und man findet die Eigenwerte $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ und $\lambda_3 = 3$, wobei man den Eigenwert $\lambda_1 = 0$ aufgrund von $\det(A) = 0$ sofort ohne Rechnung findet. Die zugehörigen Eigenvektoren sind $\mathbf{v}_1 = t(1,1,1)^T$, $\mathbf{v}_2 = s(1,0,-1)^T$ und $\mathbf{v}_3 = r(1,-2,1)^T$.

Die Matrix B hat das charakteristische Polynom $\chi_B(\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2$ und damit den doppelten Eigenwert $\lambda_{1,2} = 0$ und den einfachen Eigenwert $\lambda_3 = 3$. Zum Eigenwert λ_3 findet man die Eigenvektoren $\mathbf{v}_3 = r(1,-1,1)^T$ und für $\lambda_{1,2}$ erhält man die Eigenvektoren $\mathbf{v}_{1,2} = s(1,1,0)^T + t(-1,0,1)^T$.

Die Matrix C hat das charakteristische Polynom

$$\chi_C(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 6\lambda^2 - 4\lambda + 1 = (\lambda - 1)^4$$

mit dem vierfachen Eigenwert $\lambda = 1$. Man findet allerdings nur einen Eigenvektor $\mathbf{v}_1 = t(1,1,1,1)^T$ (λ hat die geometrische Vielfachheit 1). Zur Berechnung der Hauptvektoren \mathbf{v}_k , $k = 2,3,4$, ist das Gleichungssystem

$$(C - E)^4 \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

zu lösen. Die kann man allerdings auch sukzessiv tun, indem man die Gleichungssysteme $(C - E)\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_{k-1}$, $k = 2,3,4$, löst, wobei man ausgehend vom Eigenvektor \mathbf{v}_1 zuerst den Hauptvektor \mathbf{v}_2 , daraus den Hauptvektor \mathbf{v}_3 und schließlich den Hauptvektor \mathbf{v}_4 bestimmt. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass man explizit keine Matrixpotenzen berechnen muss. Man erhält

$$\mathbf{v}_2 = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)^T \quad \mathbf{v}_3 = \left(\frac{5}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}\right)^T \quad \mathbf{v}_4 = \left(-\frac{5}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}, -\frac{3}{8}\right)^T.$$

5) Die Eigenräume von A aus Aufgabe 4 sind Geraden im \mathbb{R}^3 , die durch den Ursprung gehen. Sei \mathbf{a} ein zum Eigenwert λ gehörender Eigenvektor von A , dann ist

$$E_\lambda = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = s\mathbf{a}, s \in \mathbb{R}\}$$

der Eigenraum zu λ . Sind \mathbf{x}_1 und \mathbf{x}_2 aus E_λ , dann ist auch die Linearkombination $\mathbf{x} = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 = (c_1s_1 + c_2s_2)\mathbf{a}$ Element von E_λ . die anderen Eigenschaften (neutrale Elemente,

inverse Elemente) sind offensichtlich. $\mathbf{b}_1 = (1,1,1)^T$ ist eine Basis von E_{λ_1} , $\mathbf{b}_2 = (1, 0, -1)^T$ und $\mathbf{b}_3 = (1, -2, 1)^T$ sind Basen von E_{λ_2} , E_{λ_3} .

6) Die Bedingung für eine Basis $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3)$ lautet

$$a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3 = \mathbf{0} \iff a_1 = a_2 = a_3 = 0.$$

Konkret für $\mathbf{x}_1 = (0,3,4)^T$, $\mathbf{x}_2 = (0,4,2)^T$, $\mathbf{x}_3 = (2,0,1)^T$ ist das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

zu betrachten. Die Determinante der Koeffizientenmatrix hat den Wert -20 , woraus die eindeutige Lösbarkeit mit der trivialen Lösung $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ folgt. Damit ist der Nachweis, dass die Ortsvektoren eine Basis bilden, erbracht.

Den ersten Vektor der Orthonormalbasis erhält man mit $\mathbf{y}_1 = \frac{\mathbf{x}_1}{|\mathbf{x}_1|} = \frac{1}{5}(0, 3, 4)^T$. Mit dem SCHMIDT'schen Orthogonalisierungsverfahren findet man $\mathbf{y}_2 = \frac{1}{5}(0, -4, 3)^T$ und $\mathbf{y}_3 = (1, 0, 0)^T$ und hat damit eine Orthonormalbasis $(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3)$ konstruiert. Die Beziehungen zwischen der Orthonormalbasis und der kanonischen Basis lauten

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{y}_3 \quad \mathbf{e}_2 = \frac{3}{5}\mathbf{y}_1 - \frac{4}{5}\mathbf{y}_2 \quad \mathbf{e}_3 = \frac{4}{5}\mathbf{y}_1 + \frac{3}{5}\mathbf{y}_2,$$

und damit hat der Vektor $(1,1,1)^T$ die Darstellung

$$(1,1,1)^T = 1 \cdot \mathbf{e}_1 + 1 \cdot \mathbf{e}_2 + 1 \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{9}{5} \cdot \mathbf{y}_1 - \frac{1}{5} \cdot \mathbf{y}_2 + 1 \cdot \mathbf{y}_3,$$

also die Koordinaten $\frac{9}{5}$, $-\frac{1}{5}$ und 1 bezüglich der Orthonormalbasis.

7) Die Gleichung $a_1 + a_2x + a_3x^2 = 0$ ist für beliebige $x \in \mathbb{R}$ nur erfüllbar, wenn $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ ist. Z.B. kann man die Gleichung für die 3 x -Werte 1,2,3 betrachten. Es ergibt sich das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

mit der einzigen Lösung $a_1 = a_2 = a_3 = 0$.

Für $p_1(x) = 1$ gilt $\|p_1\|^2 = \int_0^1 1^2 dx = 1$. Mit dem Ansatz

$$q_2(x) = p_1(x) + \lambda p_2(x) = 1 + \lambda x$$

findet man nach skalarer Multiplikation mit p_1 und der Forderung $(q_2, p_1) = 0$

$$(q_2, p_1) = 0 = (p_1, p_1) + \lambda(p_2, p_1) \iff \lambda = -\frac{1}{(p_2, p_1)} = -\frac{1}{\int_0^1 x dx} = -2$$

und damit $q_2(x) = 1 - 2x$. Mit der Norm $\|q_2(x)\| = \sqrt{\int_0^1 (1 - 2x)^2 dx} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ erhalten wir mit $r_2(x) = \sqrt{3} - 2\sqrt{3}x$ den zweiten Vektor der Orthonormalbasis. Der dritte Vektor der Basis ergibt sich mit dem SCHMIDT'schen Orthogonalisierungsverfahren zu $r_3(x) = \frac{1}{c}(-\frac{1}{2} + 3x - 3x^2)$, wobei $c = \sqrt{\frac{3}{10}}$ gleich der Norm des Polynoms $-\frac{1}{2} + 3x - 3x^2$ ist.

8+9) Die Vektor- oder Parametergleichung für die Gerade g erhält man als Lösung des Gleichungssystems

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

mit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_0 = (1, 0, 0).$$

Für den kürzesten Abstand des Punktes $P' = (1, 4, 8)$ ergibt sich

$$d = \frac{|\mathbf{a} \times \overrightarrow{P_0 P'}|}{|\mathbf{a}|} = \frac{\sqrt{720}}{\sqrt{9}} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

Die HESSEsche Normalform der Ebene E erhält man mit $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T \cdot (x, y, z)^T = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Für die Parametergleichung der Ebene E ergibt sich

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = (2, 0, 0).$$

Für den kürzesten Abstand des Punktes P' von der Ebene ergibt sich

$$\rho = |\overrightarrow{OP'} \cdot \mathbf{n} - \frac{2}{\sqrt{3}}| = |(1, 4, 8)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T - \frac{2}{\sqrt{3}}| = \frac{11}{\sqrt{3}}.$$

Der Durchstoßpunkt der Geraden g durch die Ebene E ergibt sich über die Gleichsetzung

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow r \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

mit der Lösung $r = t = -\frac{1}{3}$, $s = \frac{2}{3}$. Man erhält schließlich mit der Geradengleichung den Durchstoßpunkt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

10) Mit dem Betrag des Vektorprodukts der Ortsvektoren von A und B erhält man den doppelten Flächeninhalt des Dreiecks

$$2F = |\overrightarrow{0A} \times \overrightarrow{0B}| = |(-6, 3, -3)^T| = \sqrt{54} = 3\sqrt{6} \Leftrightarrow F = \frac{3\sqrt{6}}{2}.$$

11) Man findet mit $(2, \frac{2}{3}\sqrt{3}, 0)$ den Fußpunkt des Punktes P_3 , der zusammen mit P_1 , P_2 und dem Ursprung 0 den Tetraeder aufspannt. Die z -Koordinate von P_3 ergibt sich aus

$4 = \sqrt{2^2 + (\frac{2}{3}\sqrt{3})^2 + z^2}$ zu $z = 4\sqrt{\frac{2}{3}}$, da die Ortsvektoren von P_1 und P_3 gleich lang sein müssen. Man überlegt sich, dass das Volumen des Tetraeders gerade ein Sechstel des Volumens des Spats ist, der von den Ortsvektoren von P_1, P_2, P_3 aufgespannt wird. Es ergibt sich

$$V_T = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 2 & \frac{2}{3}\sqrt{3} & 4\sqrt{\frac{2}{3}} \end{vmatrix} = \frac{1}{6} 32\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

Das Ergebnis kann man auch überprüfen, wenn man die bekannte Pyramidenvolumen-Formel $\frac{1}{3}Gh$ mit der Grundfläche G und der Höhe h benutzt.

Kapitel 5

1) Für g und f erhält man die Ableitungen

$$f'(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2x_1 & 0 & 0 \\ 0 & 2x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 2x_3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{g}'(x, y) = \begin{pmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & -\sin y \\ ye^{xy} & xe^{xy} \end{pmatrix}.$$

Die Ableitung der Verkettung ergibt

$$\begin{aligned} (f(g(x, y)))' &= f'(g(x, y))g'(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 \sin x & 0 & 0 \\ 0 & 2 \cos y & 0 \\ 0 & 0 & 2e^{xy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & -\sin y \\ ye^{xy} & xe^{xy} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos x & 0 \\ 2 \sin x \cos x & 0 \\ 0 & -2 \cos y \sin y \\ 2ye^{2xy} & 2xe^{2xy} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2) Für den Gradienten und die Ableitung ergibt sich

$$\text{grad } f = \begin{pmatrix} \ln(x_2 x_3) + x_3 e^{x_2 + x_1 x_3} \\ \frac{x_1}{x_2} + e^{x_2 + x_1 x_3} \\ \frac{x_2}{x_3} + x_1 e^{x_2 + x_1 x_3} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\text{grad } f(x_1, x_2, x_3, x_4))^T.$$

3) Für die Ableitung ergibt sich

$$\mathbf{f}'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} y \sin z & x \sin z & xy \cos z \\ 1 & 3y^2 z & y^3 \end{pmatrix} \implies \mathbf{f}(\mathbf{x}) \approx \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4) Für den Gradienten und die HESSE-Matrix ergibt sich

$$\text{grad } f = \begin{pmatrix} yz^3 \\ xz^3 \\ 3xyz^2 \end{pmatrix} \quad H_f = \begin{pmatrix} 0 & z^3 & 3yz^2 \\ z^3 & 0 & 3xz^2 \\ 3yz^2 & 3xz^2 & 6xyz \end{pmatrix}.$$

Damit erhält man für das TAYLOR-Polynom 2. Grades um $\mathbf{x}_0 = (1, 1, 1)^T$

$$\begin{aligned} T_2(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}_0) + \text{grad } f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^T H_f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \\ &= 1 + (x - 1) + (y - 1) + 3(z - 1) \\ &\quad + \frac{1}{2}[(x - 1)(y - 1) + 3(x - 1)(z - 1) + (y - 1)(x - 1) \\ &\quad + 3(y - 1)(z - 1) + 3(z - 1)(x - 1) + 3(z - 1)(y - 1) + 6(z - 1)(z - 1)] \\ &= 1 + (x - 1) + (y - 1) + 3(z - 1) \\ &\quad + (x - 1)(y - 1) + 3(x - 1)(z - 1) + 3(y - 1)(z - 1) + 3(z - 1)^2. \end{aligned}$$

5) Die Funktion ist stetig partiell differenzierbar an der Stelle $(1, 1)^T$. Deshalb ergibt sich für die Richtungsableitung

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{a}} = \text{grad } f(\mathbf{x}) \cdot \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = -\frac{2}{\sqrt{5}}.$$

6) Die Extrema der Funktion $f(x, y, z) = xyz$ sind unter Berücksichtigung der Nebenbedingung $g(x, y, z) = x + y + z = 105$, $x, y, z \geq 0$ gesucht. Notwendige Bedingung:

$$\text{grad } L(x, y, z, \lambda) = \text{grad } (f(x, y, z) + \lambda(g(x, y, z) - 105)) = \mathbf{0} \implies \begin{array}{l} yz + \lambda = 0 \\ xz + \lambda = 0 \\ xy + \lambda = 0 \\ x + y + z = 105 \end{array} .$$

Die Kandidaten für Extremalstellen sind $K_1 = (x, y, z) = (0, 0, 105)$, $K_2 = (105, 0, 0)$, $K_3 = (0, 105, 0)$ und $K_4 = (35, 35, 35)$. Die Nebenbedingungsmenge ist kompakt, deshalb wird Maximum und Minimum angenommen, und zwar wird die Funktion an der Stelle K_4 maximal und an den Stellen K_1, K_2, K_3 minimal.

7) Zu minimieren ist die Funktion $f(x, y, z) = (x - 5)^2 + (y - 7)^2 + (z - 18)^2$ unter Berücksichtigung der Bedingung $2x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$. Die LAGRANGE-Funktion lautet

$$L(x, y, z, \lambda) = (x - 5)^2 + (y - 7)^2 + (z - 18)^2 + \lambda(2x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 - 1) .$$

Aus der notwendigen Bedingung $\text{grad } L = \mathbf{0}$ folgt das Gleichungssystem

$$2(x - 5) + \lambda 4x = 0, \quad 2(y - 7) + \lambda \frac{y}{2} = 0, \quad 2(z - 18) + \lambda 2z = 0, \quad 2x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$$

zur Bestimmung der Kandidaten für Extremalstellen. Aus den ersten 3 Gleichungen folgt

$$x = \frac{5}{1 + 2\lambda}, \quad y = \frac{28}{4 + \lambda}, \quad z = \frac{18}{1 + \lambda} .$$

Einsetzen in die vierte Gleichung ergibt mit

$$\frac{50}{1 + 4\lambda + 4\lambda^2} + \frac{196}{16 + 8\lambda + \lambda^2} + \frac{324}{1 + 2\lambda + \lambda^2} = 1$$

bzw.

$$\begin{aligned} & (16 + 8\lambda + \lambda^2)(1 + 2\lambda + \lambda^2)(1 + 4\lambda + 4\lambda^2) - 50(16 + 8\lambda + \lambda^2)(1 + 2\lambda + \lambda^2) - \\ & 196(1 + 4\lambda + 4\lambda^2)(1 + 2\lambda + \lambda^2) - 324(1 + 4\lambda + 4\lambda^2)(16 + 8\lambda + \lambda^2) \\ & = 4\lambda^6 + 44\lambda^5 - 1957\lambda^4 - 14214\lambda^3 - 35369\lambda^2 - 26400\lambda - 6164 = 0 \end{aligned}$$

ein Polynom 6. Grades für λ . Die Bestimmung von λ als Nullstelle (und den daraus folgenden kritischen Punkten (x, y, z)) ist nur numerisch möglich. Z.B. mit **octave** (freies, mit **matlab** vergleichbares Programm unter linux) erhält man die Nullstellen

$$\lambda_1 = -25,312, \quad \lambda_2 = 21,115, \quad \lambda_{3,4} = -2,883 \pm 1,442i, \quad \lambda_{5,6} = -0,518 \pm 0,094i .$$

Relevant sind nur $\lambda_{1,2}$. Als kritische Punkte erhält man schließlich

$$\begin{aligned} P_1 &= (x, y, z) = \left(\frac{5}{1 + 2\lambda_1}, \frac{28}{4 + \lambda_1}, \frac{18}{1 + \lambda_1} \right) = (-0,10076, -1,3138, -0,74038) \\ P_2 &= (x, y, z) = \left(\frac{5}{1 + 2\lambda_2}, \frac{28}{4 + \lambda_2}, \frac{18}{1 + \lambda_2} \right) = (0,11566, 1,1149, 0,81394) . \end{aligned}$$

Durch die Berechnung der Funktionswerte an den kritischen Punkten findet man bei P_1 ein Maximum $M = f(P_1) = 446,34$ und bei P_2 ein Minimum $m = f(P_2) = 353,85$, da die Nebenbedingungsmenge als Oberfläche eines Ellipsoids kompakt ist.

8) Für die Niveaus $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ergibt sich

$$\sqrt{1 - 4x^2 - 9y^2} = 1 \implies 4x^2 + 9y^2 = 0 \implies N_1 = \{(0,0)\}$$

$$\sqrt{1 - 4x^2 - 9y^2} = \frac{1}{2} \implies 4x^2 + 9y^2 = \frac{3}{4} \implies N_{\frac{1}{2}} = \left\{ \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cos t, \frac{\sqrt{3}}{6} \sin t \right), t \in [0, 2\pi] \right\}$$

$$\sqrt{1 - 4x^2 - 9y^2} = \frac{1}{4} \implies 4x^2 + 9y^2 = \frac{15}{16} \implies N_{\frac{1}{4}} = \left\{ \left(\frac{\sqrt{15}}{8} \cos t, \frac{\sqrt{15}}{12} \sin t \right), t \in [0, 2\pi] \right\}.$$

9) Für die Krümmung der Kurve γ ergibt sich

$$\kappa(t) = \frac{|\dot{\gamma}(t) \times \ddot{\gamma}(t)|}{|\dot{\gamma}(t)|^3} = \frac{12}{(9 \cos^2 t + 16 \sin^2 t)^{\frac{3}{2}}}.$$

Die Ableitung von κ ergibt

$$\kappa'(t) = -252(9 \cos^2 t + 16 \sin^2 t)^{-\frac{5}{2}} \cos t \sin t,$$

mit den Nullstellen $t_1 = 0, t_2 = \pi, t_3 = \frac{\pi}{2}, t_4 = \frac{3\pi}{2}$. Die Auswertung der 2. Ableitung bzw. die Überlegung, dass es sich bei der Kurve um den Rand einer Ellipse mit den Halbachsen $a = \sqrt{3}$ und $b = 2$ handelt, ergibt die maximale Krümmung bei t_3, t_4 und die minimale Krümmung bei t_1, t_2 . Der maximale Krümmungsradius ist demnach $R_{max} = \frac{1}{\kappa(t_1)} = \frac{27}{12} = \frac{9}{4}$.

10) Man kann die Untersuchung des Verhaltens der Funktion f aufgrund der Rotations-symmetrie auf die Untersuchung von $\hat{f}(r) = \frac{\sin r}{r}, r \in]0, 1]$, $\hat{f}(0) = 1$, zurückführen. \hat{f} ist stetig im Punkt $r = 0$. Außerdem ist \hat{f} für $r \in]0, 1]$ monoton fallend, da r schneller wächst als $\sin r$. Daraus folgt, dass die Funktion \hat{f} für $r = 0$ maximal wird, und für $r = 1$ minimal. Übersetzt auf die Funktion f heißt das, dass f auf D im Punkt $(0,0)$ das globale Maximum 1 annimmt, und auf der Kreislinie $x^2 + y^2 = 1$ das globale Minimum $\sin 1$ annimmt.

Kapitel 6

1) Auf die erforderlichen Integrationen wird nicht ausführlich eingegangen. Es ergibt sich für die nichttrivialen ($y \neq 0$) Lösungen der Differentialgleichungen

- (a) $\int \frac{dy}{y^2} = -\int \frac{2x dx}{x^2 - 1} \implies -\frac{1}{y} = -\ln|x^2 - 1| + c \implies y = \frac{1}{\ln|x^2 - 1| - c}$
- (b) $\int \frac{dy}{y \ln y} = -\int \frac{dx}{x} \implies \ln|\ln|y|| = -\ln|x| + c_0 \implies y = e^{\frac{c}{x}}$
- (c) $\int \frac{dy}{\cos^2 y} = \int \frac{2x dx}{x^2 + 1} \implies \tan y = \ln(x^2 + 1) + c \implies y = \arctan(\ln(x^2 + 1) + c)$
- (d) $\int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{\sqrt{x} dx}{x} \implies -\frac{1}{y} = 2\sqrt{x} + c \implies y = -\frac{1}{2\sqrt{x} + c}$
- (e) $\int \frac{dy}{\sinh y} = \int \frac{dx}{x^2 + 1} \implies \ln|\tanh \frac{y}{2}| = \arctan x + c_0$
 $\implies y = 2\operatorname{artanh}(ce^{\arctan x})$
- (f) $\int \frac{dy'}{y' + 1} = \int \frac{dx}{\tan x} \implies \ln|y' + 1| = \ln|\sin x| + c_0 \implies \begin{cases} y' = c \sin x - 1 \\ y = -c \cos x - x + c_1 \end{cases}$
- (g) $\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int \frac{dx}{\sin x} \implies \ln|y-1| - \ln|y| = \ln|\tan \frac{x}{2}| + c_0$
 $\implies \frac{y-1}{y} = c \tan \frac{x}{2} \implies y = \frac{1}{1 - c \tan \frac{x}{2}}$

2) Mit $u = \frac{y}{x}$ findet man

$$(a) (1-u)u = u + xu' \implies \int \frac{du}{-u^2} = \int \frac{dx}{x} \implies \frac{1}{u} = \ln x + c \implies \begin{cases} u = \frac{1}{\ln x + c} \\ y = \frac{x}{\ln x + c} \\ y(1) = 1 \implies c = 1 \end{cases} .$$

$$(b) \frac{3-u^2}{2u} = u + xu' \implies \int \frac{2u du}{3-3u^2} = \int \frac{dx}{x} \implies -\frac{1}{3} \ln|u^2 - 1| = \ln|x| + c_0$$

$$\implies \begin{cases} u = \sqrt{c|x|^{-3} + 1} \\ y = x\sqrt{c|x|^{-3} + 1} \\ y(1) = 2 \implies c = 3 \end{cases} .$$

3) Die Transformation $u(x) = y^{-1}$ führt in beiden Fällen auf lineare Differentialgleichungen. Es ergibt sich für die Gleichung (a)

$$u' - \frac{1}{x}u = -\frac{\ln x}{x}$$

mit der homogenen Lösung (Separation) $u_h(x) = cx$. Die Variation der Konstanten ergibt

$$c'(x) = -\frac{\ln x}{x^2} \implies c(x) = \frac{\ln x + 1}{x} \implies u(x) = cx + \ln x + 1 \implies y(x) = \frac{1}{cx + \ln x + 1} .$$

Im Fall der Gleichung (b) erhält man

$$u' + \frac{1}{x}u = 1 \implies u(x) = \frac{c}{x} + \frac{1}{2} \implies y(x) = \frac{x}{c + \frac{1}{2}x} .$$

4) Für die homogene Lösung von (a) ergibt sich das charakteristische Polynom $\lambda^2 + 2\lambda + 5$ mit den Nullstellen $\lambda_1 = -1 + 2i$, $\lambda_2 = -1 - 2i$, und damit die homogene Lösung $y_h = c_1 e^{-x} \cos 2x + c_2 e^{-x} \sin 2x$. Der Ansatz nach Art der rechten Seite lautet

$$y_p = A \cos 2x + B \sin 2x, \quad y_p' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x, \quad y_p'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x,$$

also

$$-4A \cos 2x - 4B \sin 2x - 4A \sin 2x + 4B \cos 2x + 5A \cos 2x + 5B \sin 2x = -\frac{17}{2} \cos 2x.$$

Der Koeffizientenvergleich ergibt die Gleichungen $4B + A = -\frac{17}{2}$ und $B - 4A = 0$ mit den Lösungen $A = -\frac{1}{2}$, $B = -2$, so dass sich die allgemeine Lösung

$$y(x) = c_1 e^{-x} \cos 2x + c_2 e^{-x} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x - 2 \sin 2x$$

ergibt. Für (b) erhält man mit den Nullstellen $\lambda_{1,2} = 3 \pm 2$ von $\lambda^2 - 6\lambda + 5$ die homogene Lösung $y_h = c_1 e^{5x} + c_2 e^x$. Der Ansatz nach Art der rechten Seite lautet aufgrund der Resonanzsituation

$$y_p = A x e^x, \quad y_p' = A e^x + A x e^x, \quad y_p'' = A e^x + A e^x + A x e^x,$$

also

$$2A e^x + A x e^x - 6A e^x - 6A x e^x + 5A x e^x = 4e^x \implies -4A = 4, \quad A = -1.$$

Damit ergibt sich die allgemeine Lösung $y(x) = c_1 e^{5x} + c_2 e^x - x e^x$.

5) Für (a) ergibt sich das charakteristische Polynom $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda$ mit den Nullstellen $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = 2 \pm i$. Damit erhält man das reelle Fundamentalsystem $y_1 = 1$, $y_2 = e^{2x} \cos x$, $y_3 = e^{2x} \sin x$ und die allgemeine Lösung

$$y(x) = c_1 + c_2 e^{2x} \cos x + c_3 e^{2x} \sin x.$$

Für (b) ergibt sich das charakteristische Polynom $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 9\lambda - 10$ mit den Nullstellen $\lambda_1 = 2$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm 2i$, so dass man das reelle Fundamentalsystem $y_1 = e^{2x}$, $y_2 = e^x \cos 2x$, $y_3 = e^x \sin 2x$ erhält. Die allgemeine Lösung lautet

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^x \cos 2x + c_3 e^x \sin 2x.$$

6) Die Fundamentallösungen implizieren die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 0$ und $\lambda_3 = 2i$, wobei die Nullstelle λ_2 eine doppelte Nullstelle sein muss, und mit λ_3 auch $\bar{\lambda}_3$ Nullstelle sein muss. Damit muss das charakteristische Polynom in jedem Fall die Faktoren $(\lambda - 2)$, λ^2 , $(\lambda - 2i)$ und $(\lambda + 2i)$ haben, so dass sich

$$(\lambda - 2)\lambda^2(\lambda^2 + 4) = \lambda^5 - 2\lambda^4 + 4\lambda^3 - 8\lambda^2$$

ergibt: Die 3 vorgegebenen Funktionen gehören zu den Fundamentallösungen der Differentialgleichung

$$y^{(5)} - 2y^{(4)} + 4y''' - 8y'' = 0.$$

7) Mit der Definition von $y_1 := y$, $y_2 := y'$, $y_3 := y''$ erhält man das äquivalente Differentialgleichungssystem

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ 3y_1 - x^2 y_2 - \sin^2 x y_3 + \cos x \end{pmatrix}.$$

8) Für das homogene System (a) erhält man die Eigenwerte $\lambda_1 = -1$ und $\lambda_{2,3} = -2$. Für λ_1 ergibt sich der Eigenvektor $\mathbf{v}_1 = (1,0,0)^T$ und für $\lambda_{2,3}$ findet man die Eigenvektoren $\mathbf{v}_2 = (-1,0,1)^T$, $\mathbf{v}_3 = (-1,1,0)^T$. Damit lautet die allgemeine Lösung

$$\mathbf{y}(x) = c_1 e^{-x} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{-2x} \mathbf{v}_2 + c_3 e^{-2x} \mathbf{v}_3 .$$

Zur Lösung des inhomogenen Systems (b) berechnet man zuerst die allgemeine Lösung des homogenen Systems. Man erhält mit dem doppelten Eigenwert $\lambda_{1,2} = 1$ nur den Eigenvektor $\mathbf{v}_1 = (1,1)^T$, weil die geometrische Vielfachheit von $\lambda_{1,2}$ gleich 1 ist. Als Lösung von $(A - 1E)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$ bestimmt man mit $\mathbf{v}_2 = (1,2)^T$ einen Hauptvektor. Damit ergibt sich für das homogene System die allgemeine Lösung

$$\mathbf{y}_h(x) = c_1 e^x \mathbf{v}_1 + c_2 e^x (\mathbf{v}_2 + x \mathbf{v}_1) .$$

Die partikuläre Lösung erhält man mit der Variation der Konstanten, man erhält das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} e^x & e^x(1+x) \\ e^x & e^x(2+x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ 0 \end{pmatrix} \implies c_1'(x) = e^x(2+x), c_2'(x) = -e^x .$$

Nach Integration ergibt sich $c_1(x) = (x+1)e^x$, $c_2(x) = -e^x$. Damit erhält man die allgemeine Lösung

$$\mathbf{y}(x) = (c_1 + (x+1)e^x)e^x \mathbf{v}_1 + (c_2 - e^x)e^x (\mathbf{v}_2 + x \mathbf{v}_1) .$$

9) Mit den Eigenwerten $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$ und den dazugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{v}_1 = (1,2)^T$, $\mathbf{v}_2 = (-1,1)^T$ erhält man für das homogene System die Lösung $\mathbf{y}_h = c_1 e^{5x} \mathbf{v}_1 + c_2 e^{-x} \mathbf{v}_2$. Die partikuläre Lösung erhält man mit der Variation der Konstanten aus dem Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} e^{5x} & -e^{-x} \\ 2e^{5x} & e^{-x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \implies c_1'(x) = \frac{2}{3} e^{-5x}, c_2'(x) = -\frac{4}{3} e^x .$$

Nach Integration ergibt sich $c_1(x) = -\frac{2}{15} e^{-5x}$, $c_2(x) = -\frac{4}{3} e^x$. Damit erhält man die allgemeine Lösung

$$\mathbf{y}(x) = (c_1 - \frac{2}{15} e^{-5x}) e^{5x} \mathbf{v}_1 + (c_2 - \frac{4}{3} e^x) e^{-x} \mathbf{v}_2 .$$

Zur Bestimmung der Lösung des Anfangswertproblems erhält man das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{8}{5} \end{pmatrix}$$

mit der Lösung $c_1 = \frac{7}{15}$, $c_2 = \frac{2}{3}$. Damit erhält man die Lösung des Anfangswertproblems mit

$$\mathbf{y}(x) = (\frac{7}{15} - \frac{2}{15} e^{-5x}) e^{5x} \mathbf{v}_1 + (\frac{2}{3} - \frac{4}{3} e^x) e^{-x} \mathbf{v}_2 .$$

10) Die Lösung des Gleichungssystem $\begin{pmatrix} x_2 \\ -k \sin x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ergibt mit $\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} n\pi \\ 0 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{Z}$, die Gleichgewichtspunkte. Zur Untersuchung des Stabilitätsverhaltens sind die Eigenwerte der Ableitungsmatrix des Systems, also der Matrix

$$F'(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k \cos x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

zu untersuchen. Für die Gleichgewichtspunkte $\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} n\pi \\ 0 \end{pmatrix}$ findet man die Eigenwerte $\lambda_n = \pm\sqrt{-k \cos n\pi}$. Man erkennt, dass die Eigenwerte λ_{2n+1} reell sind, wobei immer ein positiver reeller Eigenwert auftritt. Damit sind die Gleichgewichtspunkte \mathbf{x}_{2n+1} , $n \in \mathbb{Z}$, instabil. Die Eigenwerte $\lambda_{2n} = \pm i\sqrt{k \cos 2n\pi}$, $n \in \mathbb{Z}$ sind rein imaginär und damit sind die Gleichgewichtspunkte \mathbf{x}_{2n} , $n \in \mathbb{Z}$, stabil.

Kapitel 7

1) Unter der Voraussetzung, dass das Vektorfeld \mathbf{v} dreimal stetig partiell differenzierbar ist, kann man die Ableitungsreihenfolge vertauschen, und unter Nutzung der Beziehung $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ und $\operatorname{div}(\operatorname{grad} p) = \Delta p$ erhält man

$$\operatorname{div} \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \right) = \frac{\partial \operatorname{div} \mathbf{v}}{\partial t} = 0, \operatorname{div} \Delta \mathbf{v} = \Delta \operatorname{div} \mathbf{v} = 0 \text{ und } \operatorname{div}(\operatorname{grad} p) = \Delta p,$$

und damit ergibt sich

$$-\Delta p = \operatorname{div}[(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}].$$

2) Für die Länge der Kurve γ gilt $L = \int_0^4 \sqrt{1 + e^{2t}} dt$. Mit der Substitution $u = \sqrt{1 + e^{2t}}$ erhält man $dt = \frac{u}{u^2 - 1} du$ und damit

$$\begin{aligned} L &= \int_0^4 \sqrt{1 + e^{2t}} dt = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^8}} \frac{u^2}{u^2 - 1} du \\ &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^8}} \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} \right) \right] du = \left[u + \frac{1}{2} \ln \frac{u-1}{u+1} \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{1+e^8}} \\ &= \left[\sqrt{1+e^8} - \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{(\sqrt{1+e^8} - 1)(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{1+e^8} + 1)(\sqrt{2} - 1)} \right]. \end{aligned}$$

3) Die Parametrisierung des Nordpolarkreises ergibt $\gamma(t) = (\rho \cos t, \rho \sin t, z_n)^T, t \in [0, 2\pi]$, wobei $z_n = r \sin \phi_n$ und $\rho = r \cos \phi_n$ ist. Mit $\dot{\gamma}(t) = (-\rho \sin t, \rho \cos t, 0)^T$ erhält man für das Kurvenintegral

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(x, y, z) ds &= \int_0^{2\pi} \frac{\rho(\rho \cos^2 t - \sin t)}{z_n} \rho dt = \frac{\rho^2}{z_n} \int_0^{2\pi} (\rho \cos^2 t - \sin t) dt \\ &= \frac{\rho^2}{z_n} \left[\frac{\rho}{2} (\cos t \sin t + t) + \cos t \right]_0^{2\pi} = \frac{\rho^3 \pi}{z_n} = \frac{r^3 \cos^2 \phi_n \pi}{r \sin \phi_n} \\ &\approx 0,19056 r^2 = 7,8 \cdot 10^6 \text{ km}^2. \end{aligned}$$

4) Es ergibt sich $\operatorname{rot} \mathbf{w} = \nabla \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Da der \mathbb{R}^3 als natürlicher Definitionsbereich einfach zusammenhängend ist, handelt es sich bei \mathbf{w} um ein Potentialfeld. Als Stammfunktion erhält man mit der Ansatzmethode aus $f_x = w_1$, d.h. $f_x = yz \cos(xyz) + 2xz$ durch Integration

$$f(x, y, z) = \int (yz \cos(xyz) + 2xz) dx = \sin(xyz) + x^2 z + C(y, z)$$

und damit $f_y = xz \cos(xyz) + C_y(y, z) = xz \cos(xyz) + 2yz^2 = w_2$. Daraus folgt $C = y^2 z^2 + D(z)$. Aus $f_z = w_3$, d.h.

$$xy \cos(xyz) + x^2 + 2y^2 z + D_z = xy \cos(xyz) + x^2 + 2yz^2$$

folgt $D = \text{const.}$, so dass sich letztendlich die Stammfunktion $f(x, y, z) = \sin(xyz) + x^2 z + y^2 z^2 + \text{const.}$ ergibt.

5) Für (a) bzw. (b) erhält man die symmetrischen JACOBI-Matrizen

$$\mathbf{v}' = c \begin{pmatrix} \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} & 0 \\ \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} & -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ bzw. } \mathbf{w}' = \begin{pmatrix} -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} & \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} + 1 \\ 1 + \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} & \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix}.$$

Die Integration des Vektorfeldes \mathbf{v} entlang der Kreislinie $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)^T$, $t \in [0, 2\pi]$ ergibt mit $x^2 + y^2 = 1$ auf γ

$$\int_{\gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = c \int_0^{2\pi} (-\sin t, \cos t, 0)^T \cdot (-\sin t, \cos t, 0)^T dt = c \int_0^{2\pi} dt = 2\pi c.$$

Ebenso erhält man für $\int_{\gamma} \mathbf{w} \cdot d\mathbf{s}$ einen von Null verschiedenen Wert. D.h. weder \mathbf{v} noch \mathbf{w} sind in ihren Definitionsbereichen Potentialfelder, obwohl die Integrabilitätsbedingung erfüllt ist, da die Integrale über geschlossenen Kurven ungleich Null sind. Das liegt daran, dass in beiden Fällen die Definitionsbereiche nicht einfach zusammenhängend sind.

6) Nach Definition des Arbeitsintegrals ergibt sich

$$\int_{\gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \int_0^1 \mathbf{v}(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) dt = \int_0^1 [2t(1-t) + 1 - t^2] dt = 1.$$

Andererseits ist $\text{rot } \mathbf{v} = \mathbf{0}$ und als Stammfunktion findet man $f(x, y, z) = x^2y + xz^3$. Damit ergibt sich aus dem ersten Hauptsatz für Potentialfelder

$$\int_{\gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = f(1, 0, 1) - f(0, 1, 1) = 1 - 0 = 1.$$

7) Für die Beschleunigung erhält man $a = \frac{120 \text{ km}}{h \cdot 10 \text{ s}} = \frac{10}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Wenn wir die Erdschwere vernachlässigen, erhält man als Kraftfeld $\mathbf{k} = (75 \text{ kg} \frac{10}{3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, 0, 0)^T = (250 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}, 0, 0)^T$. Die Parametrisierung des Weges ergibt $\gamma(t) = (t \cdot 10 \text{ m}, 0, 0)^T$, $t \in [0, 1]$. Für die zu verrichtende Arbeit ergibt sich

$$\int_{\gamma} \mathbf{k} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 250 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} 10 \text{ m} dt = 2500 \text{ Nm}.$$

Anmerkung: Die in der Aufgabe vorgegebene Beschleunigung von 0 auf 120 km/h ist für einen deutschen Personenzug nicht realistisch. Bei der Aufgabenstellung haben wir möglicherweise etwas geträumt und an die Zukunft gedacht. Deutsche Personenzüge brauchen normalerweise etwa 95 s von 0 auf 120 km/h , was einer Beschleunigung von $a = 0,35 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ entspricht.

8) Die Rechnung $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ zeigt, dass \mathbf{v} ein Potentialfeld ist. Die Ansatzmethode ergibt mit $f(x, y, z) = e^{xy} + \frac{z^3}{3}$ eine Stammfunktion. Für das vektorielle Kurvenintegral erhält man damit

$$\int_{\gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = f(\gamma(2\pi)) - f(\gamma(0)) = 0,$$

da es sich bei γ um eine geschlossene Kurve handelt.

9) Es gilt $\text{div } \mathbf{v} = 0$, d.h. es existiert ein Vektorpotential \mathbf{w} . Wir setzen $w_3 = \text{const.} = c_3$. Für $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)^T$ muss

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial w_3}{\partial y} - \frac{\partial w_2}{\partial z} \\ \frac{\partial w_1}{\partial z} - \frac{\partial w_3}{\partial x} \\ \frac{\partial w_2}{\partial x} - \frac{\partial w_1}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial w_2}{\partial z} \\ \frac{\partial w_1}{\partial z} \\ \frac{\partial w_2}{\partial x} - \frac{\partial w_1}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ z \\ x \end{pmatrix}$$

gelten. Daraus folgt $w_2 = -yz + C(x, y)$ und $w_1 = \frac{z^2}{2} + D(x, y)$. Aus der 3. Gleichung folgt $C_x = D_y$, so dass $\mathbf{w} = (\frac{z^2}{2} + c_1, -yz + c_2, c_3)^T$ mit reellen Konstanten c_1, c_2, c_3 ein

Vektorpotential von \mathbf{v} ist.

10) Die Berechnung des Arbeitsintegrals entlang der Schraubenlinie ergibt

$$\int_{\gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} (-\sin t, \cos t, 2)^T \cdot (-\sin t, \cos t, 1)^T dt = \int_0^{2\pi} (1 + 2) dt = 6\pi .$$

Kapitel 8

1) Um die Halbachsen der Ellipse zu ermitteln, muss die Gleichung auf Normalform gebracht werden. Es gilt

$$(x, y) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + 6y^2 + 4xy,$$

mit den Eigenwerten $\lambda_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{41}}{2}$ der Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ kann man die Ellipse in der Form

$$\lambda_1 \bar{x}^2 + \lambda_2 \bar{y}^2 = 1$$

beschreiben, wobei \bar{x}, \bar{y} die Koordinaten in einem transformierten kartesischen Koordinatensystem sind. Als Halbachsen findet man damit $a = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7+\sqrt{41}}}$ und $b = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7-\sqrt{41}}}$. Mit der Flächeninhaltsformel ergibt sich mit der Parametrisierung $\mathbf{x}(t) = (a \cos t, b \sin t)^T$, $t \in [0, 2\pi]$ des Ellipsenrandes

$$F_E = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [-b \sin t (-a \sin t) + a \cos t b \cos t] dt = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} dt = ab\pi.$$

Damit erhält man $F_E = \frac{2}{\sqrt{(7+\sqrt{41})(7-\sqrt{41})}} \pi = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$.

2) Es ergibt sich für die Integrale

$$\begin{aligned} (a) \quad & \int_0^1 \int_x^{2-x^2} dy dx = \int_0^1 \int_0^y dx dy + \int_1^2 \int_0^{\sqrt{2-y}} dx dy = \frac{7}{6}, \\ (b) \quad & \int_{-2}^0 \int_{y^2-4}^0 dx dy = \int_{-4}^0 \int_{-\sqrt{x+4}}^0 dy dx = \frac{16}{3}, \\ (c) \quad & \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} dx dy = \int_0^1 \int_0^{x^2} dy dx + \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} dy dx \\ & = \frac{1}{3} + 2 \left[\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = -\frac{1}{6} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Beim letzten Integral wurde für $\sqrt{2-x^2}$ mit der Substitution $x = \sqrt{2} \sin u$, $dx = \sqrt{2} \cos u du$ die Stammfunktion $\frac{x}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}} + \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}}$ berechnet.

3) Beim Integral (a) ist der Integrationsbereich ein Kreissektor. Daher bietet sich eine Transformation in Polarkoordinaten an. Es ergibt sich mit der Transformationsformel

$$\begin{aligned} (a) \quad & \int_0^2 \int_x^{\sqrt{8-x^2}} \frac{1}{5+x^2+y^2} dy dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{8}} \frac{r}{5+r^2} dr d\phi \\ & = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} \ln(5+r^2) \right]_0^{\sqrt{8}} d\phi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} \ln 13 - \frac{1}{2} \ln 5 \right) d\phi = \frac{\pi}{8} \ln \frac{13}{5}. \end{aligned}$$

Beim Integral (b) ist über den oberen Halbkreis mit dem Radius 3 zu integrieren. Mit der Transformation auf Polarkoordinaten und der Transformationsformel ergibt sich

$$\begin{aligned} (b) \quad & \int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy dx = \int_0^\pi \int_0^3 \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi} r dr d\phi \\ & = \int_0^\pi \int_0^3 r^2 dr d\phi = \int_0^\pi \frac{r^3}{3} \Big|_0^3 d\phi = 9\pi. \end{aligned}$$

4) Mit $\dot{\gamma}(t) = (-3 \cos^2 t \sin t, 3 \sin^2 t \cos t)^T$ und der Flächeninhaltsformel ergibt sich

$$\begin{aligned} F(B) &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [-\sin^3 t (-3 \cos^2 t \sin t) + \cos^3 t \cdot 3 \sin^2 t \cos t] dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} [\sin^4 t \cos^2 t + \cos^4 t \sin^2 t] dt = \frac{3}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt \\ &= \frac{3}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2(2t) dt = \frac{3}{16} \int_0^{4\pi} \sin^2 z dz = \frac{3}{16} \left[\frac{z}{2} - \frac{1}{2} \sin z \cos z \right]_0^{4\pi} = \frac{3}{8} \pi. \end{aligned}$$

5) Im Fall (a) ergibt sich die Parametrisierung des Randes des Dreiecks zu

$$\gamma_1(t) = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}, t \in [0,1], \quad \gamma_2(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3t \end{pmatrix}, t \in [0,1], \quad \gamma_3(t) = \begin{pmatrix} 1-t \\ 3-3t \end{pmatrix}, t \in [0,1].$$

Damit erhält man

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\gamma_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_0^1 \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt + \int_0^1 \begin{pmatrix} 1-3t \\ 3t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} dt + \int_0^1 \begin{pmatrix} 1-t-3+3t \\ (1-t)3(1-t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^1 (t + 9t - 1 + t + 3 - 3t - 9 + 18t - 9t^2) dt = \int_0^1 (-7 + 26t - 9t^2) dt = 3. \end{aligned}$$

Mit dem Satz von GREEN erhält man das Integral über das Dreieck D

$$\begin{aligned} \int_D (y+1) dF &= \int_0^1 \int_0^{3x} (y+1) dy dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_0^{3x} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{9x^2}{2} + 3x \right) dx = \left[\frac{3x^3}{2} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 = 3. \end{aligned}$$

Für das Integral (b) erhält man das Kurvenintegral über die Kreislinie K mit dem Radius 3

$$\begin{aligned} \int_K \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} -9 \sin^2 t \\ 9 \cos^2 t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \sin t \\ 3 \cos t \end{pmatrix} dt \\ &= 27 \int_0^{2\pi} (\sin^3 t + \cos^3 t) dt = 27 \int_0^{2\pi} [(1 - \cos^2 t) \sin t + (1 - \sin^2 t) \cos t] dt \\ &= 27 \left[-\cos t + \frac{\cos^3 t}{3} + \sin t - \frac{\sin^3 t}{3} \right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

Mit dem Satz von GREEN ergibt sich das Integral

$$\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} (2x+2y) dy dx,$$

das ebenfalls den Wert Null hat.

6) Für das Integral (a) erhält man

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^{y^2} \int_0^y \cos \frac{x}{y} dz dx dy &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{y^2} [z \cos \frac{x}{y}]_0^y dx dy \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{y^2} y \cos \frac{x}{y} dx dy = \int_0^{\pi/2} [y^2 \sin \frac{x}{y}]_0^{y^2} dy \\ &= \int_0^{\pi/2} y^2 \sin y dy = [-y^2 \cos y]_0^{\pi/2} + 2 \int_0^{\pi/2} y \cos y dy \\ &= 0 + 2[y \sin y]_0^{\pi/2} - 2 \int_0^{\pi/2} \sin y dy = \pi + 2[\cos y]_0^{\pi/2} = \pi - 2. \end{aligned}$$

Für das Integral (b) ergibt sich

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{2-x^2-y^2} xye^z dz dx dy = \int_0^1 \int_0^1 [xye^z]_0^{2-x^2-y^2} dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 (xye^{2-x^2-y^2} - xy) dx dy. \end{aligned}$$

Mit der Substitution $u = 2 - x^2 - y^2$, $du = -2xdx$ erhält man

$$\int xye^{2-x^2-y^2} dx = -\frac{1}{2} \int ye^u du = -\frac{1}{2} ye^u = -\frac{1}{2} ye^{2-x^2-y^2} + c.$$

Damit ergibt sich

$$I = \int_0^1 [-\frac{1}{2} ye^{2-x^2-y^2}]_0^1 dy - \int_0^1 [\frac{x^2 y}{2}]_0^1 dy = \int_0^1 (-\frac{1}{2} ye^{1-y^2} + \frac{1}{2} ye^{2-y^2}) dy - \frac{1}{2} \int_0^1 y dy.$$

Mit der Substitution $u = a - y^2$, $du = -2ydy$ erhält man

$$\int ye^{a-y^2} dy = -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u + c = -\frac{1}{2} e^{a-y^2} + c.$$

Daraus folgt schließlich

$$I = [\frac{1}{4} e^{1-y^2}]_0^1 + [-\frac{1}{4} e^{2-y^2}]_0^1 - \frac{1}{4} [y^2]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} e - \frac{1}{4} e + \frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{2} e.$$

7) Im Fall (a) ergibt sich für das Volumen des Körpers

$$\begin{aligned} \int_B dV &= \int_0^2 \int_{x^3}^8 [\int_0^4 dy] dz dx = \int_0^2 \int_{x^3}^8 4 dz dx \\ &= \int_0^2 [4z]_{x^3}^8 dx = \int_0^2 (32 - 4x^3) dx = [32x - x^4]_0^2 = 48. \end{aligned}$$

Man kann natürlich auch die Integrationsreihenfolge ändern, d.h.

$$\int_B dV = \int_0^4 [\int_0^2 (\int_{x^3}^8 dz) dx] dy$$

zur Berechnung des Volumens von B benutzen.

Das Volumen im Fall (b) ergibt sich zu

$$\begin{aligned} \int_B dV &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{y^2}^{4-y^2} [\int_0^3 dz] dx dy = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{y^2}^{4-y^2} 3 dx dy = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [3x]_{y^2}^{4-y^2} dy \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (12 - 6y^2) dy = [12y - 2y^3]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = 24\sqrt{2} - 4\sqrt{2}^3 = 16\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Auch in diesem Fall kann man eine andere Integrationsreihenfolge verwenden:

$$\int_B dV = \int_0^3 \left[\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \left(\int_{y^2}^{4-y^2} dx \right) dy \right] dz$$

führt ebenso auf das Ergebnis $\int_B dV = 16\sqrt{2}$.

8) Mit den Steigungsparametern u, v findet man $y = ux - 1$, $u \in [1, 2]$, $y = 1 - \frac{x}{v}$, $v \in [1, 2]$, und damit die Transformation

$$\mathbf{x} : [1, 2] \times [1, 2] \rightarrow B, \quad x(u, v) = \frac{2v}{1+uv}, \quad y(u, v) = \frac{uv-1}{1+uv}.$$

Für die Funktionaldeterminante ergibt sich

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} -\frac{2v^2}{(uv+1)^2} & \frac{2}{(uv+1)^2} \\ \frac{2v}{(uv+1)^2} & \frac{2u}{(uv+1)^2} \end{pmatrix} = \frac{-4v(uv+1)}{(uv+1)^4} = -4 \frac{v}{(uv+1)^3},$$

so dass man mit der Transformationsformel

$$\begin{aligned} \int_B \frac{1}{x^3} dx dy &= \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{x(u, v)^3} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \int_1^2 \int_1^2 \frac{1}{2v^2} du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{v^2} [u]_1^2 dv = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{v^2} dv = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{v} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} + 1 \right] = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

erhält.

9) Für die Masse erhält man

$$\begin{aligned} M &= \int_0^L \int_0^L \int_0^L a e^{-cz} dz dy dx = \int_0^L \int_0^L \left[-\frac{a}{c} e^{-cz} \right]_0^L dy dx \\ &= \int_0^L \int_0^L \frac{a}{c} (1 - e^{-cL}) dy dx = \frac{aL^2}{c} (1 - e^{-cL}). \end{aligned}$$

Mit Hilfe von

$$\int z e^{-cz} dz = -\frac{z}{c} e^{-cz} + \int \frac{1}{c} e^{-cz} dz = -\frac{z}{c} e^{-cz} - \frac{1}{c^2} e^{-cz} + k$$

ergibt sich für die z -Koordinate des Schwerpunktes

$$\begin{aligned} \bar{z} &= \frac{1}{M} \int_0^L \int_0^L \int_0^L z a e^{-cz} dz dy dx = \frac{a}{M} \int_0^L \int_0^L \left[-\frac{z}{c} e^{-cz} - \frac{1}{c^2} e^{-cz} \right]_0^L dy dx \\ &= \frac{a}{M} \int_0^L \int_0^L \left(-\frac{L}{c} e^{-cL} - \frac{1}{c^2} e^{-cL} + \frac{1}{c^2} \right) dy dx \\ &= \frac{a}{cM} \left(-Le^{-cL} - \frac{1}{c} e^{-cL} + \frac{1}{c} \right) \int_0^L \int_0^L dy dx \\ &= \frac{aL^2}{cM} \left(-Le^{-cL} - \frac{1}{c} e^{-cL} + \frac{1}{c} \right) = \frac{-Le^{-cL} - \frac{1}{c} e^{-cL} + \frac{1}{c}}{1 - e^{-cL}} = \frac{1}{c} + \frac{Le^{-cL}}{e^{-cL} - 1}. \end{aligned}$$

Für die x - und y -Koordinaten des Schwerpunktes findet man mit Rechnung oder durch bloße Überlegung $\bar{x} = \bar{y} = \frac{L}{2}$.

10) Für den Auftrieb erhält man mit $\mathbf{v} = (0, 0, z)^T$, $\operatorname{div} \mathbf{v} = 1$ und dem Satz von GAUSS

$$\rho_w g \int_{\partial B} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dO} = \rho_w g \int_B \operatorname{div} \mathbf{v} dV = \rho_w g \int_B dV = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho_w g ,$$

da die Kugel mit dem Radius R das Volumen $\frac{4}{3} \pi R^3$ hat. Da nirgends benutzt wurde, dass der Körper kugelförmig ist, ist der Auftrieb eines Körpers K allein durch sein Volumen $\int_K dV$ und seine Dichte ρ_w (und natürlich die jeweilige Erdbeschleunigung) bestimmt.

11) Es ist $\operatorname{div} \mathbf{v} = 2z - 2$, damit ergibt sich im Fall (a) nach dem Satz von GAUSS für das Flussintegral

$$\int_{\partial B} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dO} = \int_B (2z - 2) dV .$$

Mit Zylinderkoordinaten $(r, \phi, z) \in [0, 4] \times [0, 2\pi] \times [1, 5]$ und der Transformationsformel für Volumenintegrale erhält man

$$\begin{aligned} \int_B (2z - 2) dV &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_1^5 (2z - 2) r dz d\phi dr = \int_0^4 \int_0^{2\pi} r [z^2 - 2z]_1^5 d\phi dr \\ &= \int_0^4 \int_0^{2\pi} 16r d\phi dr = \int_0^4 32r\pi dr = [16r^2\pi]_0^4 = 256\pi . \end{aligned}$$

Mit Kugelkoordinaten $(r, \phi, \theta) \in [0, R] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$, der Funktionaldeterminante $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \phi, \theta)} = r^2 \sin \theta$ und dem Satz von GAUSS erhält man im Fall (b)

$$\begin{aligned} \int_{\partial B} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dO} &= \int_B (2x + 3y^2 + 3z^2) dV = \int_B [3(x^2 + y^2 + z^2) + 2x - 3x^2] dV \\ &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 3r^2 r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr \\ &\quad + \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [2r \cos \phi \sin \theta - 3r^2 \cos^2 \phi \sin^2 \theta] r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr . \end{aligned}$$

Für den ersten Summanden der rechten Seite erhält man

$$\begin{aligned} \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi 3r^2 r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr \\ = \int_0^R \int_0^{2\pi} [-3r^4 \cos \theta]_0^\pi d\phi dr = \int_0^R \int_0^{2\pi} 6r^4 d\phi dr = [12\pi \frac{r^5}{5}]_0^R = \frac{12}{5} \pi R^5 . \end{aligned}$$

Für den zweiten Summanden ergibt sich

$$\begin{aligned} \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [2r \cos \phi \sin \theta - 3r^2 \cos^2 \phi \sin^2 \theta] r^2 \sin \theta d\theta d\phi dr \\ = 2 \int_0^R r^3 \int_0^{2\pi} \cos \phi [\frac{\theta}{2} - \frac{1}{2} \cos \theta \sin \theta]_0^\pi d\phi dr \\ \quad - 3 \int_0^R r^4 \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi [-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3}]_0^\pi d\phi dr \\ = -3 \int_0^R r^4 \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \frac{4}{3} d\phi dr = -4 \int_0^R r^4 [\frac{1}{2} \cos \phi \sin \phi + \frac{\phi}{2}]_0^{2\pi} dr \\ = -4\pi \int_0^R r^4 dr = -\frac{4}{5} \pi R^5 . \end{aligned}$$

Damit erhält man insgesamt das Resultat

$$\int_{\partial B} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{O} = \frac{12}{5}\pi R^5 - \frac{4}{5}\pi R^5 = \frac{8}{5}\pi R^5 .$$

Kapitel 9

1) Für die Gleichung (a) ergibt der Ansatz $u(x, y) = X(x)Y(y)$ nach dem Einsetzen in die Differentialgleichung und der Voraussetzung $u(x, y) = X(x)Y(y) \neq 0$

$$\begin{aligned} X''(x)Y(y) &= 4X(x)Y'(y), \quad X(0) = X(\pi) = 0, \\ X''(x)Y(y) &= 4X(x)Y'(y) \iff \frac{X''}{X} = \frac{4Y'}{Y} = \mu, \end{aligned}$$

mit einer freien Konstanten μ . Die Lösung der Gleichung $\frac{4Y'}{Y} = \mu$ ist $Y(y) = ke^{\frac{\mu}{4}y}$. Für die Differentialgleichung $X'' - \mu X = 0$ erhält man als Lösung im Fall

$\mu > 0$ $X(x) = c_1 e^{\sqrt{\mu}x} + c_2 e^{-\sqrt{\mu}x}$, aus $X(0) = X(\pi) = 0$ folgt $c_1 = c_2 = 0$, also die triviale Lösung,

$\mu = 0$ $X(x) = c_1 + c_2 x$, aus $X(0) = X(\pi) = 0$ folgt $c_1 = c_2 = 0$, also die triviale Lösung,

$\mu < 0$ $X(x) = c_1 \cos(\sqrt{-\mu}x) + c_2 \sin(\sqrt{-\mu}x)$, aus $X(0) = 0$ folgt $c_1 = 0$; aus $X(\pi) = c_2 \sin(\sqrt{-\mu}\pi) = 0$ ergibt sich $\sqrt{-\mu}\pi = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, $\mu = -n^2$, so dass sich die Lösungen $X_n(x) = c_2 \sin nx$ ergeben.

Für die Lösung des Randwertproblems (a) erhält man schließlich die Lösungen $u_n(x, y) = kc_2 \sin nx e^{-\frac{n^2}{4}y} =: b_n \sin nx e^{-\frac{n^2}{4}y}$. Das Superpositionsprinzip ergibt die allgemeine Lösung

$$u(x, y) = \sum_{-\infty}^{\infty} b_n \sin nx e^{-\frac{n^2}{4}y}.$$

Für die Gleichung (b) ergibt der Ansatz $u(x, t) = X(x)T(t)$

$$a^2 X''(x)T(t) = \ddot{T}(t)X(x) \iff a^2 X''(x) = \mu X(x), \quad \ddot{T}(t) = \mu T(t)$$

mit einer freien Konstanten μ . Als Lösungen $X(x)$ und $T(t)$ findet man durch Integration

$$X(x) = c_1 e^{\frac{\sqrt{\mu}}{a}x} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{\mu}}{a}x} \quad T(t) = d_1 e^{\sqrt{\mu}t} + d_2 e^{-\sqrt{\mu}t},$$

so dass sich die Lösung $u(x, t) = (c_1 e^{\frac{\sqrt{\mu}}{a}x} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{\mu}}{a}x})(d_1 e^{\sqrt{\mu}t} + d_2 e^{-\sqrt{\mu}t})$ mit den freien reellen Konstanten μ, c_1, c_2, d_1, d_2 ergibt. Bei $\mu > 0$ erhält man die Produkte von Exponentialfunktionen als Lösung und bei $\mu < 0$ ergeben sich mit der EULERSchen Formel Produkte von trigonometrischen Funktionen als Lösung.

2) Mit dem Ansatz $u(x, t) = X(x)T(t)$ erhält man durch Einsetzen für $XT \neq 0$ in die Differentialgleichung

$$xX'T + t\dot{T}X = xXT \iff X' - \left(1 - \frac{\mu}{x}\right)X = 0, \quad \dot{T} - \frac{\mu}{t}T = 0.$$

Durch Variablenseparation erhält man die Lösungen X und T

$$X(x) = c_1 e^x x^{-\mu} \quad T(t) = c_2 t^\mu \quad \text{und damit} \quad u(x, t) = ce^x x^{-\mu} t^\mu.$$

Die Auswertung der Bedingung $u(x, 1) = x^2 e^x$ ergibt $c = 1$ und $\mu = -2$. Die Lösung lautet damit $u(x, t) = e^x \left(\frac{x}{t}\right)^2$.

3) Für die Hyperbelkoordinaten gilt $\phi = \operatorname{arctanh} \frac{y}{x}$, $\rho = \sqrt{x^2 - y^2}$ und damit

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{\sinh \phi}{\rho}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\cosh \phi}{\rho}, \quad \frac{\partial \rho}{\partial x} = \cosh \phi, \quad \frac{\partial \rho}{\partial y} = -\sinh \phi.$$

Damit erhält man mit $u(x, y) = v(\rho(x, y), \phi(x, y))$ und der Kettenregel

$$u_x = v_\rho \rho_x + v_\phi \phi_x = v_\rho \cosh \phi - v_\phi \frac{\sinh \phi}{\rho}, \quad u_y = v_\rho \rho_y + v_\phi \phi_y = -v_\rho \sinh \phi + v_\phi \frac{\cosh \phi}{\rho}.$$

Für die 2. Ableitungen ergibt sich dann

$$\begin{aligned} u_{xx} &= v_{\rho\rho} \cosh^2 \phi - v_{\rho\phi} \frac{\sinh \phi \cosh \phi}{\rho} - v_\rho \frac{\sinh^2 \phi}{\rho} - v_{\phi\rho} \frac{\sinh \phi \cosh \phi}{\rho} \\ &\quad + v_{\phi\phi} \frac{\sinh^2 \phi}{\rho^2} + 2v_\phi \frac{\sinh \phi \cosh \phi}{\rho^2}, \\ u_{yy} &= v_{\rho\rho} \sinh^2 \phi - v_{\rho\phi} \frac{\sinh \phi \cosh \phi}{\rho} - v_\rho \frac{\cosh^2 \phi}{\rho} - v_{\phi\rho} \frac{\sinh \phi \cosh \phi}{\rho} \\ &\quad + v_{\phi\phi} \frac{\cosh^2 \phi}{\rho^2} + 2v_\phi \frac{\sinh \phi \cosh \phi}{\rho^2}. \end{aligned}$$

Damit ergibt sich nach Addition die Differentialgleichung in Hyperbelkoordinaten

$$u_{xx} - u_{yy} = v_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} v_\rho - \frac{1}{\rho^2} v_{\phi\phi} = 0 \quad \text{für } |\rho| < 1$$

mit den Randbedingungen $v(\pm 1, \phi) = \cosh^2 \phi + \sinh^2 \phi$.

4) Der Produktansatz $v(\rho, \phi) = R(\rho)\Phi(\phi)$ führt nach Einsetzen in die Differentialgleichung $v_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho} v_\rho - \frac{1}{\rho^2} v_{\phi\phi} = 0$ auf die gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$\Phi'' - \mu\Phi = 0 \quad \rho^2 R'' + \rho R' - \mu R = 0.$$

5) Parallelströmung bedeutet $v = 0$. Damit ergibt sich aus den Differentialgleichung mit dem vorgegebenen Ansatz für den Druck p

$$u \frac{\partial u}{\partial x} = -(p_1 - p_0) + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Wegen der Voraussetzung einer Parallelströmung mit $v = 0$ folgt aus der geforderten Divergenzfreiheit $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y} = 0$. Damit ergibt sich die Gleichung

$$0 = -(p_1 - p_0) + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}. \tag{2}$$

Die Integration der Gleichung (2) in y -Richtung ergibt

$$u(x, y) = Re(p_1 - p_0) \frac{y^2}{2} + cy + d,$$

und die Berücksichtigung der Haftbedingung $u = 0$ an den Wänden $y = 0$ und $y = H$ ergibt mit

$$0 = u(x, 0) = d \quad 0 = Re(p_1 - p_0) \frac{H^2}{2} + cH \iff c = -Re(p_1 - p_0) \frac{H}{2}$$

die Lösung $\mathbf{u}(x, y) = (Re(p_1 - p_0) [\frac{y^2}{2} - y \frac{H}{2}], 0)^T$ des Randwertproblems.

6) Die Anwendung des Divergenzoperators auf das Vektorfeld $(\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial v}{\partial t})^T$ ergibt

$$\operatorname{div} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial t} \\ \frac{\partial v}{\partial t} \end{pmatrix} = \frac{\partial \operatorname{div} \mathbf{u}}{\partial t} = -\operatorname{div}(\operatorname{grad} p) + \frac{1}{Re} \operatorname{div} \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} = -\Delta p - \frac{1}{Re} \Delta \operatorname{div} \mathbf{u} = 0,$$

und daraus folgt $\Delta p = 0$ wegen $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$.

7) Die Multiplikation der Differentialgleichung mit einer integrierbaren Funktion h , die auf Γ_d verschwindet, und die anschließende Integration über Ω ergibt

$$-\int_{\Omega} \Delta u h dF = \int_{\Omega} f h dF$$

und die Anwendung der 1. GREENSchen Integralformel in der Ebene ergibt

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla h dF - \int_{\Gamma} h \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla h dF - \int_{\Gamma_d} h \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds - \int_{\Gamma_n} h \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \int_{\Omega} f h dF.$$

Die Berücksichtigung der Randbedingungen ergibt schließlich

$$\int_{\Omega} [\nabla u \cdot \nabla h - f h] dF - \int_{\Gamma_n} q h ds = 0.$$

Kapitel 10

1) Die komplexen Hyperbelfunktionen sind wie im Reellen durch die Beziehungen $\sinh z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$, $\cosh z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$ erklärt, und deshalb gilt

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = \frac{1}{4}[e^{2z} + 2 + e^{-2z}] - \frac{1}{4}[e^{2z} - 2 + e^{-2z}] = 1.$$

Weiter gilt mit der 3. binomischen Formel

$$\sinh 2z = \frac{1}{2}(e^{2z} - e^{-2z}) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})(e^z - e^{-z}) = 2 \cosh z \sinh z.$$

Für $\cosh(z+w)$ gilt nach Definition

$$\cosh(z+w) = \frac{1}{2}(e^{z+w} + e^{-z-w}) = \frac{1}{2}(e^z e^w + e^{-z} e^{-w}).$$

Für $\cosh z \cosh w + \sinh z \sinh w$ errechnet man

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4}(e^z + e^{-z})(e^w + e^{-w}) + \frac{1}{4}(e^z - e^{-z})(e^w - e^{-w}) = \\ & \frac{1}{4}(e^z e^w + e^{-z} e^w + e^z e^{-w} + e^{-z} e^{-w} + e^z e^w - e^{-z} e^w - e^z e^{-w} + e^{-z} e^{-w}) \\ & = \frac{1}{4}(2e^z e^w + 2e^{-z} e^{-w}) = \frac{1}{2}(e^{z+w} + e^{-z-w}) = \cosh(z+w). \end{aligned}$$

2) Für die Ableitungen von $\phi = \arctan \frac{y}{x}$ findet man

$$\phi_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \phi_{xx} = \frac{y2x}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \phi_y = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \phi_{yy} = -\frac{x2y}{(x^2 + y^2)^2},$$

woraus $\Delta \phi = 0$ folgt.

3) Für die Ableitungen von Φ ergibt sich

$$\Phi_x = e^x \cos y + x e^x \cos y - y e^x \sin y, \quad \Phi_{xx} = e^x \cos y + e^x \cos y + x e^x \cos y - y e^x \sin y,$$

$$\Phi_y = -x e^x \sin y - e^x \sin y - y e^x \cos y, \quad \Phi_{yy} = -x e^x \cos y - e^x \cos y - e^x \cos y + y e^x \sin y,$$

woraus $\Phi_{xx} + \Phi_{yy} = 0$ folgt. Als konjugiert harmonische Funktion Ψ findet man als Stammfunktion des Vektorfeldes

$$\begin{pmatrix} -\Phi_y \\ \Phi_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+1)e^x \sin y + y e^x \cos y \\ (1+x)e^x \cos y - y e^x \sin y \end{pmatrix} \text{ die Funktion } \Psi = y e^x \cos y + x e^x \sin y.$$

4+5) Mit der Wahl von $z_1 = -1 + i$, $z_2 = 1 + 3i$, $z_3 = 3 + i$ und $w_1 = -1$, $w_2 = i$, $w_3 = 1$ ergibt sich für die Transformation der Kreise mit der Transformationsformel

$$\frac{z+1-i}{z-3-i} \frac{1+3i-3-i}{1+3i+1-i} = \frac{w+1i-1}{w-1i+1} \implies w = \frac{z-1-i}{2}.$$

Für die Transformation des Kreises auf die Gerade wählen wir $z_1 = 1$, $z_2 = 3i$, $z_3 = -i$ und $w_1 = 2$, $w_2 = 2 - i$, $w_3 = 2 + i$ und erhalten

$$\frac{z-1}{z+i} \frac{3i+i}{3i-1} = \frac{w-2}{w-2-i} \frac{2-i-2-i}{2-i-2} \implies w = \frac{-2iz+8-2i}{(1-i)z+3-i}.$$

6) Für die Ableitung gilt $F'(z) = u_x + iv_x$, so dass sich

$$\begin{aligned} F'(z) &= F'(x + iy) = (\ln \sqrt{x^2 + y^2})_x + i(\arctan \frac{y}{x})_x \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + i \frac{-y}{x^2 + y^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{1}{z} \end{aligned}$$

ergibt.

7) Mit einer Partialbruchzerlegung und der Formel (10.31) erhält man

$$\frac{\sin z}{z(z^2 - 1)} = \frac{\sin z}{z} - \frac{1}{2} \frac{\sin z}{z + 1} - \frac{1}{2} \frac{\sin z}{z - 1}$$

und damit die Residuen

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\sin z}{z}, 0\right) = \frac{1}{0!} \sin 0 = 0, \quad \operatorname{Res}\left(\frac{\frac{1}{2} \sin z}{z \pm 1}, \mp 1\right) = \frac{1}{0!} \frac{1}{2} \sin(\mp 1) = \mp \frac{1}{2} \sin 1.$$

8) Für die Parametrisierung der Kreislinie erhält man $z(t) = e^{it} + i = \cos t + i(\sin t + 1)$, $t \in [0, 2\pi]$ und damit $\dot{z}(t) = i e^{it} = -\sin t + i \cos t$. Es ergibt sich

$$\begin{aligned} \int_K z \bar{z} dz &= \int_0^{2\pi} (e^{it} + i)(e^{-it} - i) i e^{it} dt \\ &= \int_0^{2\pi} [i e^{it} + e^{2it} - 1 + i e^{it}] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (e^{it} + i)^2 dt = -2\pi. \end{aligned}$$

9) Man findet durch partielle Integration die Stammfunktion $f(z) = (z - 1)e^z$. Damit erhält man für das Integral

$$\int_K z e^z dz = f(1 + i) - f(-1 - i) = i e^{1+i} - (-2 - i) e^{-1-i} = i e e^i + \frac{2+i}{e e^i},$$

und, sortiert nach Real- und Imaginärteil

$$\int_K z e^z dz = \frac{2 \cos 1 + \sin 1 - e^2 \sin 1}{e} + i \frac{e^2 \cos 1 + \cos 1 - 2 \sin 1}{e}.$$

10) Für das Integral (a) erhält man mit den Singularitäten der Funktion $f(z) = \frac{z^2+1}{z^4+1}$ in der oberen Halbebene $z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$, $z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$ die Residuen

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(\frac{z^2+1}{z^4+1}, z_1\right) &= \frac{z_1^2+1}{4z_1^3} = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{1+i}{-1+i} = -\frac{\sqrt{2}}{4} i, \\ \operatorname{Res}\left(\frac{z^2+1}{z^4+1}, z_2\right) &= \frac{z_2^2+1}{4z_2^3} = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{1-i}{1+i} = -\frac{\sqrt{2}}{4} i. \end{aligned}$$

Mit der Berechnungsformel (10.32) ergibt sich

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx = 2\pi i \left[-\frac{\sqrt{2}}{4} i - \frac{\sqrt{2}}{4} i \right] = \sqrt{2}\pi.$$

Für das Integral (b) erhält man mit der Formel (10.35)

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos t} dt = 2\pi \sum_{|z_k| < 1} \operatorname{Res}\left(\frac{2}{z^2 + 4z + 1}, z_k\right).$$

Man erhält die Singularitäten $z_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$ von $\frac{2}{z^2 + 4z + 1}$, von denen z_1 im Inneren des Einheitskreises liegt. Damit ergibt sich

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos t} dt = 2\pi \operatorname{Res}\left(\frac{2}{z^2 + 4z + 1}, -2 + \sqrt{3}\right) = 2\pi \frac{2}{2z + 4} \Big|_{z=-2+\sqrt{3}} = \frac{2}{3}\sqrt{3}\pi.$$

11) Für das komplexe Strömungspotential findet man $f(z) = (1 - 2i)z + \frac{4+8i}{z}$. Mit

$$f'(z) = (1 - 2i) - \frac{4 + 8i}{z^2} = (1 - 2i) - \frac{(4 + 8i)\bar{z}^2}{|z|^4} = \frac{(1 - 2i)|z|^4 - (4 + 8i)\bar{z}^2}{|z|^4}$$

findet man für das komplexe Geschwindigkeitsfeld

$$\begin{aligned} v(z) &= \overline{f'(z)} = \frac{(1 + 2i)|z|^4 - (4 - 8i)z^2}{|z|^4} \\ &= 1 + \frac{-4(x^2 - y^2) - 16xy}{(x^2 + y^2)^2} + i\left[2 + \frac{8(x^2 - y^2) - 8xy}{(x^2 + y^2)^2}\right]. \end{aligned}$$

Kapitel 11

1) Das uneigentliche Integral ist definiert als

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^3 dx = \lim_{\substack{r \rightarrow \infty \\ R \rightarrow \infty}} \int_{-r}^R x^3 dx = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^a x^3 dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R x^3 dx .$$

Weder $\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^a x^3 dx$ noch $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R x^3 dx$ existiert, und damit konvergiert das Integral nicht. Für den CAUCHYSchen Hauptwert findet man

$$C.H. \int_{-\infty}^{\infty} x^3 dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A x^3 dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-A}^A = 0 .$$

2) Man erhält mit der EULERSchen Formel

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)](\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{a^2 + t^2} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{a^2 + t^2} dt - i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega t)}{a^2 + t^2} dt \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{a^2 + t^2} dt , \end{aligned}$$

da die Funktion $\frac{\sin(\omega t)}{a^2 + t^2}$ ungerade ist. Für das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{a^2 + t^2} dt$ erhält man mit der Substitution $\sigma = \omega t$, $dt = \frac{d\sigma}{\omega}$, und wegen $\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \mathcal{F}[f(t)](-\omega)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{a^2 + t^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \sigma}{|\omega|(a^2 + (\frac{\sigma}{\omega})^2)} d\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\omega| \cos \sigma}{|\omega|^2 a^2 + \sigma^2} d\sigma .$$

Mit dem Residuensatz bzw. den daraus folgenden Beziehungen für reelle Integrale ergibt sich

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\omega| \cos \sigma}{|\omega|^2 a^2 + \sigma^2} d\sigma &= \operatorname{Re} \left[2\pi i \sum_{\operatorname{Im} \sigma_k > 0} \operatorname{Res} \left(\frac{|\omega| e^{i\sigma}}{\sigma^2 + |\omega|^2 a^2}, \sigma_k \right) \right] \\ &= \operatorname{Re} \left[2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{|\omega| e^{i\sigma}}{(\sigma - ia|\omega|)(\sigma + ia|\omega|)}, ia|\omega| \right) \right] = \operatorname{Re} \left[2\pi i \frac{|\omega| e^{-a|\omega|}}{2ia|\omega|} \right] = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|} . \end{aligned}$$

Damit erhält man schließlich

$$\mathcal{F} \left[\frac{1}{a^2 + t^2} \right] (\omega) = \frac{1}{2a} e^{-a|\omega|} .$$

3) Es sei darauf hingewiesen, dass das in der Aufgabenstellung erfragte Faltungsprodukt sich um den Faktor $\frac{1}{2\pi}$ von dem im Kapitel 11 definierten Faltungsprodukt unterscheidet. Nichtsdestotrotz ist das erfragte Integral ein Faltungsprodukt. Man erhält

$$\begin{aligned} (f * g)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-c|t-\tau|} \cos(\omega\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t e^{-ct+c\tau} \cos(\omega\tau) d\tau + \int_t^{\infty} e^{-c\tau+ct} \cos(\omega\tau) d\tau . \end{aligned}$$

Für das Integral $\int e^{a\tau} \cos(\omega\tau) d\tau$ ergibt sich durch partielle Integration

$$\begin{aligned} \int e^{a\tau} \cos(\omega\tau) d\tau &= e^{a\tau} \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega} - \frac{a}{\omega} \int e^{a\tau} \sin(\omega\tau) d\tau \\ &= e^{a\tau} \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega} - \frac{a}{\omega} \left[e^{a\tau} \frac{-\cos(\omega\tau)}{\omega} - \frac{a}{\omega} \int e^{a\tau} (-\cos(\omega\tau)) d\tau \right] \\ &= e^{a\tau} \frac{\sin(\omega\tau)}{\omega} + \frac{a}{\omega^2} e^{a\tau} \cos(\omega\tau) - \frac{a^2}{\omega^2} \int e^{a\tau} \cos(\omega\tau) d\tau , \end{aligned}$$

also

$$\int e^{a\tau} \cos(\omega\tau) d\tau = \frac{\omega e^{a\tau}}{\omega^2 + a^2} [\sin(\omega\tau) + \frac{a}{\omega} \cos(\omega\tau)] .$$

Damit erhält man für $(f * g)(t)$

$$\begin{aligned} & e^{-ct} \lim_{r \rightarrow -\infty} \left[\frac{\omega e^{ct}}{\omega^2 + c^2} (\sin(\omega t) + \frac{c}{\omega} \cos(\omega t)) - \frac{\omega e^{cr}}{\omega^2 + c^2} (\sin(\omega r) + \frac{a}{\omega} \cos(\omega r)) \right] \\ & + e^{ct} \lim_{r \rightarrow \infty} \left[\frac{\omega e^{-cr}}{\omega^2 + c^2} (\sin(\omega r) + \frac{-c}{\omega} \cos(\omega r)) - \frac{\omega e^{-ct}}{\omega^2 + c^2} (\sin(\omega t) + \frac{-c}{\omega} \cos(\omega t)) \right] \\ & = 2e^{-ct} \frac{\omega e^{ct}}{\omega^2 + c^2} \frac{c}{\omega} \cos(\omega t) = 2 \frac{c}{\omega^2 + c^2} \cos(\omega t) , \end{aligned}$$

also $(f * g)(t) = 2 \frac{c}{(\omega^2 + c^2)} \cos(\omega t)$.

4) Für die FOURIERtransformierte von f gilt

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)](\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(-\omega t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} f(t) i \sin(-\omega t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) i \sin(-\omega t) dt = \frac{-i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt , \end{aligned}$$

da die Funktion $f(t) \cos(-\omega t)$ ungerade ist. Da $f(t) \sin(\omega t)$ eine gerade Funktion ist, gilt schließlich

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \frac{-i}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt .$$

5) Es ergibt sich für die Differentialgleichung

$$\mathcal{F}[y'' + 2y' - 6y](\omega) = (i\omega)^2 \mathcal{F}[y](\omega) + 2i\omega \mathcal{F}[y](\omega) - 6\mathcal{F}[y](\omega) = \mathcal{F}[e^{-t^2}](\omega) .$$

Für die FOURIERtransformierte von e^{-t^2} findet man

$$\mathcal{F}[e^{-t^2}](\omega) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4}} \quad \text{und damit} \quad \mathcal{F}[y](\omega) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{e^{-\frac{\omega^2}{4}}}{-\omega^2 + 2i\omega - 6} .$$

6) Im Falle (a) gilt $e^{bt} \cos(at) = \text{Re}(e^{(b+ia)t})$, so dass man

$$\mathcal{L}[f(t)] = \text{Re} \left(\int_0^{\infty} e^{(b+ia)t} e^{-zt} dt \right) = \text{Re} \left(\frac{1}{z - b - ia} \right) = \text{Re} \left(\frac{z - b + ia}{(z - b)^2 + a^2} \right) ,$$

also $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{z-b}{(z-b)^2 + a^2}$ erhält, wobei $\text{Re } z > b$ gefordert werden muss. Im Fall (b) gilt $e^{bt} \sinh(at) = \frac{1}{2} [e^{(b+a)t} - e^{(b-a)t}]$, so dass man mit der LAPLACE-Transformierten der Exponentialfunktion e^{ct} für $\text{Re } z > \max\{b - a, b + a\}$ das Ergebnis

$$\mathcal{L}[g(t)] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{z - (b+a)} - \frac{1}{z - (b-a)} \right] = \frac{a}{(z-b)^2 - a^2}$$

erhält.

7) Für $F(z)$ ergibt sich

$$F(z) = \frac{3z - 5}{z^2 - 4z + 3} = \frac{3z - 5}{(z - 1)(z - 3)} = \frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z - 3},$$

und man findet $A = 1$ und $B = 2$. Damit gilt

$$F(z) = \mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{z - 1} + \frac{2}{z - 3} = \mathcal{L}[e^t] + 2\mathcal{L}[e^{3t}] = \mathcal{L}[e^t + 2e^{3t}],$$

so dass aus dem Eindeutigkeitssatz $f(t) = e^t + 2e^{3t}$ folgt. Für $G(z)$ erhält man

$$G(z) = \frac{1}{z} \mathcal{L}[\sin 2t] = \mathcal{L}\left[\int_0^t \sin 2\tau d\tau\right] = \mathcal{L}\left[-\frac{1}{2} \cos 2\tau \Big|_0^t\right] = \mathcal{L}\left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2t)\right].$$

Damit erhält man $g(t) = \frac{1}{2}(1 - \cos 2t)$.

8) Die Transformation der Differentialgleichung ergibt

$$\begin{aligned} z^2 Y(z) - zy(0) - y'(0) + 4(zY(z) - y(0)) + 6Y(z) &= \frac{1}{z} + \frac{1}{z + 1} \\ \implies (z^2 + 4z + 6)Y(z) &= \frac{2z + 1}{z(z + 1)} \implies Y(z) = \frac{2z + 1}{z(z + 1)(z^2 + 4z + 6)}. \end{aligned}$$

Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$Y(z) = \frac{2z + 1}{z(z + 1)(z^2 + 4z + 6)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z + 1} + \frac{Cz + D}{z^2 + 4z + 6}$$

ergibt nach Koeffizientenvergleich $A = \frac{1}{6}, B = \frac{1}{3}, C = -\frac{1}{2}, D = -\frac{5}{3}$.

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{6z} + \frac{1}{3(z + 1)} + \frac{-\frac{1}{2}z - \frac{5}{3}}{z^2 + 4z + 6} = \frac{1}{6z} + \frac{1}{3(z + 1)} + \frac{-\frac{1}{2}(z + 2) - \frac{2}{3}}{(z + 2)^2 + 2} \\ &= \frac{1}{6z} + \frac{1}{3(z + 1)} - \frac{1}{2} \frac{z + 2}{(z + 2)^2 + 2} - \frac{2}{3\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{(z + 2)^2 + 2}, \end{aligned}$$

woraus $y(t) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \cos(\sqrt{2}t) - \frac{\sqrt{2}}{3}e^{-2t} \sin(\sqrt{2}t)$ folgt.

9) Die Transformation des Differentialgleichungssystems ergibt unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen

$$\begin{aligned} zU(z) + \frac{1}{2} &= U(z) + 4V(z) + \frac{1}{z-1} \\ zV(z) - 1 &= U(z) + V(z) + \frac{1}{z-1} \end{aligned} \iff \begin{aligned} (1-z)U(z) + 4V(z) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{z-1} \\ U(z) + (1-z)V(z) &= -1 - \frac{1}{z-1} \end{aligned},$$

mit den Lösungen

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{-\frac{1}{2}z^2 + 6z - \frac{3}{2}}{(z - 1)(z + 1)(z - 3)} = -\frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z + 1} + \frac{3}{2} \frac{1}{z - 3} \\ V(z) &= \frac{z^2 - \frac{3}{2}z + \frac{3}{2}}{(z - 1)(z + 1)(z - 3)} = -\frac{1}{4} \frac{1}{z - 1} + \frac{1}{2} \frac{1}{z + 1} + \frac{3}{4} \frac{1}{z - 3}. \end{aligned}$$

Die Rücktransformation ergibt die Lösungen

$$u(t) = -e^t - e^{-t} + \frac{3}{2}e^{3t} \quad v(t) = -\frac{1}{4}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{3}{4}e^{3t}.$$

10) Nach dem Faltungssatz gilt

$$\mathcal{L}[\cos t]\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[t \sin t] \iff \frac{z}{z^2+1}\mathcal{L}[f(t)] = \frac{2z}{(z^2+1)^2} \iff \mathcal{L}[f(t)] = \frac{2}{z^2+1},$$

d.h. $f(t) = 2 \sin t$.

11) Mit der Substitution $v(r) = y(r + \pi)$ erhält man statt der zu lösenden Differentialgleichung die Differentialgleichung

$$v''(r) - 2v'(r) + v(r) = \sin(2r + 2\pi) + \cos(r + \pi) = \sin 2r - \cos r,$$

wobei $v'(0) = 0$ und $v(0) = 1$ gilt (also LAPLACE-gemäße Anfangsbedingungen). Die Transformation des Anfangswertproblems ergibt

$$\begin{aligned} z^2V(z) - zv(0) - v'(0) - 2zV(z) + 2v(0) + V(z) &= \frac{2}{z^2+4} + \frac{z}{z^2+1}, \\ \iff V(z)(z^2 - 2z + 1) &= z - 2 + \frac{2}{z^2+4} + \frac{z}{z^2+1}. \end{aligned}$$

Es ergibt sich weiter

$$\begin{aligned} V(z) &= \frac{(z-2)(z^2+4)(z^2+1) + 2(z^2+1) + z(z^2+4)}{(z-1)^2(z^2+4)(z^2+1)} \\ &= \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{Cz+D}{z^2+4} + \frac{Ez+F}{z^2+1} \\ &= \frac{21}{25} \frac{1}{z-1} - \frac{1}{10} \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{4}{25} \frac{z}{z^2+4} - \frac{6}{25} \frac{1}{z^2+4} - \frac{1}{2} \frac{1}{z^2+1} \\ &= \frac{21}{25} \frac{1}{z-1} - \frac{1}{10} \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{4}{25} \frac{z}{z^2+4} - \frac{3}{25} \frac{2}{z^2+4} - \frac{1}{2} \frac{1}{z^2+1}, \end{aligned}$$

und damit

$$\mathcal{L}[v(r)] = \mathcal{L}\left[\frac{21}{25}e^r - \frac{1}{10}re^r + \frac{4}{25}\cos 2r - \frac{3}{25}\sin 2r - \frac{1}{2}\sin r\right].$$

An dieser Stelle sei der Fairness halber darauf hingewiesen, dass wir das beim Koeffizientenvergleich entstehende lineare Gleichungssystem zur Bestimmung der 6 Koeffizienten A, B, \dots, F mit dem Programm **octave** gelöst haben. Damit erhält man die Lösung

$$v(r) = \frac{21}{25}e^r - \frac{1}{10}re^r + \frac{4}{25}\cos 2r - \frac{3}{25}\sin 2r - \frac{1}{2}\sin r.$$

Die Rücksubstitution $y(x) = v(x - \pi)$ ergibt

$$\begin{aligned} y(x) &= v(x - \pi) = \frac{21}{25}e^{x-\pi} - \frac{1}{10}(x - \pi)e^{x-\pi} \\ &\quad + \frac{4}{25}\cos(2x - 2\pi) - \frac{3}{25}\sin(2x - 2\pi) - \frac{1}{2}\sin(x - \pi) \\ y(x) &= \frac{1}{50}e^{x-\pi}[42 - 5(x - \pi)] + \frac{4}{25}\cos 2x - \frac{3}{25}\sin 2x + \frac{1}{2}\sin x. \end{aligned}$$

12) Die GREENSche Funktion erhält man über das Urbild der LAPLACE-Transformierten $\frac{1}{z^3 - 3z^2 + 3z - 1}$. Es gilt nun

$$\frac{1}{z^3 - 3z^2 + 3z - 1} = \frac{1}{(z-1)^3} = \mathcal{L}\left[\frac{t^2 e^t}{2}\right] = \mathcal{L}[g(t)],$$

so dass man die GREENsche Funktion

$$K(t, \tau) = g(t - \tau) = \frac{(t - \tau)^2 e^{t-\tau}}{2}$$

findet. Als Lösung des Anfangswertproblems erhält man mit der GREENschen Funktion

$$y(t) = \int_0^t K(t, \tau) e^\tau d\tau = \int_0^t \frac{(t - \tau)^2 e^{t-\tau}}{2} e^\tau d\tau = e^t \frac{t^3}{6}.$$

13) Mit $U(x, z) := \mathcal{L}[u(x, t)](z)$ erhält man für $\operatorname{Re} z > 0$ die gewöhnliche Differentialgleichung mit z als Parameter

$$zU - xU_x = \frac{x}{z^2} \iff U_x + \frac{z}{x}U = \frac{1}{z^2},$$

mit der homogenen Lösung $U_h(x, z) = c(z)x^{-z}$. Die Variation der Konstanten $U(x, z) = c(x, z)x^{-z}$ ergibt

$$U(x, z) = \frac{1}{z^2(z+1)}x + k(z)x^{-z}.$$

Aus der Transformation der Randbedingung $\lim_{x \rightarrow 0} U(x, z) = 0$ folgt $k(z) = 0$. Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$U(x, z) = \frac{1}{z^2(z+1)}x = \left(-\frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z+1}\right)x = x\mathcal{L}[-1 + t + e^{-t}](z)$$

und damit die Lösung $u(x, t) = x(-1 + t + e^{-t})$.

Kapitel 12

1) Für die Differenz $f(u+h) - f(u)$ ergibt sich unter Nutzung des Additionstheorems für die Kosinusfunktion

$$\begin{aligned} f(u+h) - f(u) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(u(\phi) + h(\phi)) d\phi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u(\phi) d\phi \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos u(\phi) \cos h(\phi) - \sin u(\phi) \sin h(\phi) - \cos u(\phi)] d\phi \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos u(\phi)(\cos h(\phi) - 1) - \sin u(\phi)h(\phi) + \sin u(\phi)(h(\phi) - \sin h(\phi))] d\phi \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u(\phi)h(\phi) d\phi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos u(\phi)(\cos h(\phi) - 1) + \sin u(\phi)(h(\phi) - \sin h(\phi))] d\phi \\ &=: - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u(\phi)h(\phi) d\phi + r(u(\phi), h(\phi)). \end{aligned}$$

Aufgrund einfacher Abschätzungen geht $\frac{1}{\|h(\phi)\|} |r(u(\phi), h(\phi))|$ gegen Null für $\|h\| \rightarrow 0$, so dass man die FRECHET-Ableitung

$$f'[u](h) = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u(\phi)h(\phi) d\phi$$

erhält.

2) Da $F(t, x, \dot{x})$ nicht von t abhängt, ergibt sich aus der EULER-LAGRANGE-Differentialgleichung

$$\frac{\dot{x}x\dot{x}}{\sqrt{x(1+\dot{x}^2)}} - \sqrt{x(1+\dot{x}^2)} = c_1 = \text{const.} \implies -x = c_1 \sqrt{x(1+\dot{x}^2)} \implies \dot{x} = \sqrt{\frac{x-c_1^2}{c_1^2}}.$$

Als Lösung erhält man nach Integration

$$2\sqrt{x-c_1^2} = \frac{t}{\sqrt{c_1^2}} - c_0 \implies x(t) = \frac{1}{4} \left(\frac{t}{|c_1|} - c_0 \right)^2 + c_1^2.$$

3) Man erhält die EULER-LAGRANGE-Differentialgleichung

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = \dot{x} - (\ddot{x} + \dot{x}) = 0 \text{ mit der Lösung } x(t) = c_1 t + c_2.$$

Die Auswertung der Bedingungen $x(0) = 1$ und $x(2) = 2$ ergibt die Lösung $x(t) = \frac{1}{2}t + 1$.

4) Da $F(t, x, \dot{x})$ nicht von x abhängt, ergibt sich aus der EULER-LAGRANGE-Differentialgleichung $\dot{x} = \text{const.}$. Damit ergibt sich die Lösung $x(t) = c_1 t + c_2$ und mit der Randbedingung $x(0) = 0$ folgt $c_2 = 0$. Aus der Forderung $x(T) = r(T)$ folgt $c_1 = \frac{1}{T^3}$. Die Transversalitätsbedingung lautet

$$\dot{x}(T)\dot{r}(T) + 1 = -\frac{1}{T^3} \frac{1}{T} + 1 = 0$$

mit der positiven Lösung $T = 1$ und damit $x(t) = t$. Man überlegt sich mit einer Skizze der Funktionen $r(t)$ und $x(t)$, dass die Funktion $x(t) = t$ die kürzeste Verbindung zwischen dem Ursprung und dem Graphen der Funktion $r(t)$ ist, und damit das Funktional $J(x)$ minimiert.

Kapitel 13

1) Zur Berechnung der kontravarianten Komponenten ist das Gleichungssystem

$$\mathbf{x} = x^j \mathbf{e}_j \iff \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

zu lösen. Als Lösung findet man $x^1 = 7$, $x^2 = 0$, $x^3 = -3$. Mit den Skalarprodukten $x_i = \mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_i$ ergibt sich für die kovarianten Koeffizienten $x_1 = 9$, $x_2 = 11$ und $x_3 = 14$.

2) Die Verjüngung von $\mathbf{T} = t_{jkl}^i \mathbf{e}_i \mathbf{e}^j \mathbf{e}^k \mathbf{e}^l$ ergibt z.B.

$$\mathbf{V}_1 = t_{jkl}^i \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^j \mathbf{e}^k \mathbf{e}^l = t_{jkl}^i \delta_i^j \mathbf{e}^k \mathbf{e}^l =: a_{kl} \mathbf{e}^k \mathbf{e}^l .$$

Als zweite Möglichkeit ergibt sich

$$\mathbf{V}_2 = t_{jkl}^i \mathbf{e}_i \mathbf{e}^j \cdot \mathbf{e}^k \mathbf{e}^l = t_{jkl}^i g^{jk} \mathbf{e}_i \mathbf{e}^l =: b_i^l \mathbf{e}_i \mathbf{e}^l .$$

3) Das tensorielle Produkt ergibt

$$\mathbf{TR} = t_{ij} r_k^l \mathbf{e}^i \mathbf{e}^j \mathbf{e}^k \mathbf{e}_l$$

und eine der möglichen Verjüngungen ergibt

$$\mathbf{U}_1 = t_{ij} r_k^l \mathbf{e}^i \mathbf{e}^j \cdot \mathbf{e}^k \mathbf{e}_l = t_{ij} r_k^l g^{jk} \mathbf{e}^i \mathbf{e}_l =: u_i^l \mathbf{e}^i \mathbf{e}_l$$

und als 2. Möglichkeit sei

$$\mathbf{U}_2 = t_{ij} r_k^l \mathbf{e}^i \mathbf{e}^j \mathbf{e}^k \cdot \mathbf{e}_l = t_{ij} r_k^l \delta_l^k \mathbf{e}^i \mathbf{e}^j =: v_{ij} \mathbf{e}^i \mathbf{e}^j$$

genannt.

4) Die skalare Multiplikation der beiden Transformationsbeziehungen ergibt

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_i &= a_i^{j'} \mathbf{e}_{j'} \mid \cdot \mathbf{e}_{j'} \implies a_i^{j'} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_{j'} \\ \mathbf{e}_{j'} &= a_{j'}^i \mathbf{e}_i \mid \cdot \mathbf{e}_i \implies a_{j'}^i = \mathbf{e}_{j'} \cdot \mathbf{e}_i . \end{aligned}$$

Daraus folgt $a_i^{j'} = a_{j'}^i$, also $D = C^T$. Andererseits ist $D = C^{-1}$, woraus $C^T = C^{-1}$ folgt.

5) Mit der Beziehung $\mathbf{e}_j = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x_j}$ erhält man die natürlichen Basisvektoren

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_r = \begin{pmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_\phi = \begin{pmatrix} -r \sin \phi \sin \theta \\ r \cos \phi \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_\theta = \begin{pmatrix} r \cos \phi \cos \theta \\ r \sin \phi \cos \theta \\ -r \sin \theta \end{pmatrix} .$$

Für die Metrikkoeffizienten ergibt sich

$$\begin{aligned} g_{11} &= \cos^2 \phi \sin^2 \theta + \sin^2 \phi \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \\ g_{22} &= r^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \phi \sin^2 \theta = r^2 \sin^2 \theta \\ g_{33} &= r^2 \cos^2 \phi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2 . \end{aligned}$$

Für $i \neq j$ ergibt sich für die Koeffizienten $g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$.

6) Für den Gradienten gilt $\nabla \Psi = \partial_i \Psi \mathbf{e}^i$ und mit $x^1 = \rho$, $x^2 = \phi$ und $x_3 = z$ ergibt sich

$$\partial_1 \Psi = 2\rho \cos \phi, \quad \partial_2 \Psi = -\rho^2 \sin \phi, \quad \partial_3 \Psi = 1$$

und mit den kontravarianten Basisvektoren im Zylinderkoordinatensystem

$$\mathbf{e}^\rho = \mathbf{e}_\rho = \cos \phi \mathbf{e}_x + \sin \phi \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}^\phi = \rho^{-2} \mathbf{e}_\phi = -\frac{1}{\rho} \sin \phi \mathbf{e}_x + \frac{1}{\rho} \cos \phi \mathbf{e}_y, \quad \mathbf{e}^z = \mathbf{e}_z$$

erhält man den Gradienten

$$\begin{aligned} \nabla \Psi &= 2\rho \cos \phi \mathbf{e}^\rho + (-\rho^2 \sin \phi) \mathbf{e}^\phi + \mathbf{e}^z \\ &= (2\rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi) \mathbf{e}_x + (2\rho \sin \phi \cos \phi - \rho \sin \phi \cos \phi) \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} \rho(\cos^2 \phi + 1) \\ \rho \sin \phi \cos \phi \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

7) Mit der natürlichen Basis (Aufgabe 5) gilt mit $x^1 = r$, $x^2 = \phi$ und $x^3 = \theta$

$$\mathbf{v} = v^i \mathbf{e}_i = v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y + v_z \mathbf{e}_z,$$

oder

$$\begin{aligned} &v^1 (\cos \phi \sin \theta \mathbf{e}_x + \sin \phi \sin \theta \mathbf{e}_y + \cos \theta \mathbf{e}_z) + \\ &v^2 (-r \sin \phi \sin \theta \mathbf{e}_x + r \cos \phi \sin \theta \mathbf{e}_y) + \\ &v^3 (r \cos \phi \cos \theta \mathbf{e}_x + r \sin \phi \cos \theta \mathbf{e}_y - r \sin \theta \mathbf{e}_z) \\ &= v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y + v_z \mathbf{e}_z. \end{aligned}$$

Damit kann man die kontravarianten Komponenten v^i als Lösung des Gleichungssystems

$$\begin{pmatrix} \cos \phi \sin \theta & -r \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \cos \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -r \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

in Abhängigkeit von den kartesischen Geschwindigkeitskomponenten v_x , v_y und v_z berechnen. Geeignete Linearkombinationen der ersten und zweiten Gleichung ergeben

$$(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi) \sin \theta v^2 = -v_x \sin \phi + v_y \cos \phi \implies v^2 = \frac{1}{r \sin \theta} (-\sin \phi v_x + \cos \phi v_y)$$

und

$$\begin{pmatrix} \sin \theta & r \cos \theta \\ \cos \theta & -r \sin \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ v^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi v_x + \sin \phi v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

mit der Lösung

$$v^1 = \sin \theta (\cos \phi v_x + \sin \phi v_y) + \cos \theta v_z, \quad v^3 = \frac{1}{r} [\cos \theta (\cos \phi v_x + \sin \phi v_y) - \sin \theta v_z].$$

Für die kovarianten Komponenten von \mathbf{v} erhält man aufgrund der Beziehung $v_i = g_{ij} v^j$ mit den Ergebnissen der Aufgabe 5

$$v_1 = v^1, \quad v_2 = r(-\sin \phi v_x + \cos \phi v_y), \quad v_3 = r[\cos \theta (\cos \phi v_x + \sin \phi v_y) - \sin \theta v_z].$$

8) Für das CHRISTOFFEL-Symbol Γ_{ih}^i erhält man

$$\Gamma_{ih}^i = \frac{1}{2} g^{ij} \partial_h g_{ij} = \frac{1}{2} (g^{11} \partial_h g_{11} + g^{12} \partial_h g_{12} + g^{21} \partial_h g_{21} + g^{22} \partial_h g_{22}).$$

Andererseits ist

$$\frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^h} = \frac{1}{2g} \frac{\partial (g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21})}{\partial x^h} = \frac{1}{2g} (g_{11}\partial_h g_{22} + g_{22}\partial_h g_{11} - g_{12}\partial_h g_{21} - g_{21}\partial_h g_{12}) .$$

Die Inverse (g^{ij}) von (g_{ij}) ergibt sich mit g als Determinante von (g_{ij}) zu

$$\begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g} \begin{pmatrix} g_{11} & -g_{21} \\ -g_{12} & g_{22} \end{pmatrix}$$

und damit ist

$$\begin{aligned} \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^h} &= \frac{1}{2g} (g_{11}\partial_h g_{22} + g_{22}\partial_h g_{11} - g_{12}\partial_h g_{21} - g_{21}\partial_h g_{12}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{g_{11}}{g} \partial_h g_{22} + \frac{g_{22}}{g} \partial_h g_{11} - \frac{g_{12}}{g} \partial_h g_{21} - \frac{g_{21}}{g} \partial_h g_{12} \right) \\ &= \frac{1}{2} (g^{11}\partial_h g_{11} + g^{12}\partial_h g_{12} + g^{21}\partial_h g_{21} + g^{22}\partial_h g_{22}) = \Gamma_{ih}^i , \end{aligned}$$

also die Beziehung $\Gamma_{ih}^i = \frac{1}{2g} \frac{\partial g}{\partial x^h}$ gezeigt.

9) Es gilt $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \epsilon^{kij} v_i w_j \mathbf{e}_k$ und damit

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= \operatorname{div}(\epsilon^{kij} v_i w_j \mathbf{e}_k) = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_k (\sqrt{g} \epsilon^{kij} v_i w_j) \\ &= \frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{1}{2\sqrt{g}} \partial_k g \right) \epsilon^{kij} v_i w_j + \partial_k (\epsilon^{kij} v_i w_j) = \partial_k (\epsilon^{kij} v_i w_j) \\ &= \epsilon^{kij} w_j \partial_k v_i + \epsilon^{kij} v_i \partial_k w_j = \epsilon^{kij} w_j \partial_k v_i \mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}^j + \epsilon^{kij} v_i \partial_k w_j \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^i \\ &= \epsilon^{kij} \partial_k v_i \mathbf{e}_j \cdot (w_j \mathbf{e}^j) + \epsilon^{kij} \partial_k w_j \mathbf{e}_i \cdot (v_i \mathbf{e}^i) \\ &= (\operatorname{rot} \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} - \epsilon^{ikj} \partial_k w_j \mathbf{e}_i \cdot (v_i \mathbf{e}^i) \\ &= (\operatorname{rot} \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} - (\operatorname{rot} \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = (\operatorname{rot} \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} - \mathbf{v} \cdot (\operatorname{rot} \mathbf{w}) . \end{aligned}$$

Die Identität ist somit bewiesen ($\partial_k g = 0$, $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}^i = 1$, $\epsilon^{kij} = -\epsilon^{ikj}$ und die Kommutativität des Skalarprodukts wurden benutzt).

Kapitel 14

1) Es ist

$$m_1 = E(X) = (-q) \frac{1}{2q^2} + 0 \cdot \left(1 - \frac{1}{q^2}\right) + q \frac{1}{2q^2} = 0$$

$$\sigma^2 = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) = (-q)^2 \frac{1}{2q^2} + 0^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{q^2}\right) + q^2 \frac{1}{2q^2} = 1.$$

Also ist

$$P\{|X - m_1| \geq k\sigma\} = P\{|X| \geq k\} = \begin{cases} 0 & \text{für } k > q \\ P\{X = q\} + P\{X = -q\} = \frac{1}{q^2} & \text{für } 0 < k \leq q \end{cases}.$$

Für $k > q$ ist

$$P\{|X - m_1| \geq k\sigma\} < \frac{1}{k^2},$$

die TSCHEBYSCHIEWSche Ungleichung also mit " $<$ " erfüllt. Für $k = q$ ist

$$P\{|X - m_1| \geq k\sigma\} = \frac{1}{k^2}$$

die TSCHEBYSCHIEWSche Ungleichung also mit " $=$ " erfüllt; sie kann also nicht verschärft werden, wenn man die Verteilungen der Zufallsgröße X nicht einschränken will. Für $k < q$ ist

$$P\{|X - m_1| \geq k\sigma\} = \frac{1}{q^2} < \frac{1}{k^2},$$

also die TSCHEBYSCHIEWSche Ungleichung mit " $<$ " erfüllt.

2a) Es ist

$$\begin{aligned} P\{|d - 10| > 0,4\} &= 1 - P\{|d - 10| \leq 0,4\} = 1 - P\{9,6 \leq d \leq 10,4\} \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{10,4 - 10}{0,5}\right) - \Phi\left(\frac{9,6 - 10}{0,5}\right)\right] \\ &= 1 - \left[\Phi\left(\frac{0,4}{0,5}\right) - \Phi\left(\frac{-0,4}{0,5}\right)\right] = 1 - [\Phi(0,8) + \Phi(0,8) - 1] \\ &= 2 \cdot (1 - \Phi(0,8)) = 2 \cdot (1 - 0,788) = 0,424. \end{aligned}$$

42,4% der Kugeln werden abgelehnt.

2b) Es muss $P\{|d - 10| \leq 0,4\} \geq 0,8$ sein.

$$\begin{aligned} P\{-0,4 \leq d - 10 \leq 0,4\} &= P\{9,6 \leq d \leq 10,4\} = P\{|d - 10| \leq 0,4\} \\ &= \Psi\left(\frac{10,4 - 10}{\sigma}\right) - \Psi\left(\frac{9,6 - 10}{\sigma}\right) \\ &= \Psi\left(\frac{0,4}{\sigma}\right) - \Psi\left(\frac{-0,4}{\sigma}\right) = \Psi\left(\frac{0,4}{\sigma}\right) + \Psi\left(\frac{0,4}{\sigma}\right) - 1 \\ &= 2\Psi\left(\frac{0,4}{\sigma}\right) - 1 \geq 0,8, \\ \Psi\left(\frac{0,4}{\sigma}\right) &\geq \frac{1}{2} 1,8 = 0,9, \end{aligned}$$

also $\frac{0,4}{\sigma} \geq 1,29$ bzw. $\sigma \leq \frac{0,4}{1,29} \leq 0,31$. Somit darf die Standardabweichung nicht größer als 0,31 sein, um das Ziel der "80%-Akzeptanz" zu erreichen.

3) Wir setzen

$$\begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} = (k_{jl}).$$

$$\begin{aligned} \sum_{j,k=1,2} k_{jl}c_jc_k &= \sigma_X^2c_1^2 + \rho\sigma_X\sigma_Yc_1c_2 + \rho\sigma_Y\sigma_Xc_2c_1 + \sigma_Y^2c_2^2 \\ &= \sigma_X^2c_1^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Yc_1c_2 + \sigma_Y^2c_2^2 \\ &= (c_1\sigma_X + c_2\rho\sigma_Y)^2 - c_2\rho^2\sigma_Y^2 + c_2^2\sigma_Y^2 \\ &= (c_1\sigma_X + c_2\rho\sigma_Y)^2 + (1 - \rho^2)c_2^2\sigma_Y^2, \end{aligned}$$

also ist $k_{jl}c_jc_l > 0$ für alle c_1, c_2 mit $c_1^2 + c_2^2 > 0$ genau dann, wenn $1 - \rho^2 > 0$ bzw. $\rho^2 < 1$ ist.

4a) Ausmultiplizieren ergibt

$$\begin{aligned} Q^2 &= -(x - m_X, y - m_Y) \begin{pmatrix} \frac{x - m_X}{(1 - \rho^2)\sigma_X^2} + \frac{\rho(y - m_Y)}{(1 - \rho^2)\sigma_X\sigma_Y} \\ \frac{\rho(x - m_X)}{(1 - \rho^2)\sigma_X\sigma_Y} + \frac{y - m_Y}{(1 - \rho^2)\sigma_Y^2} \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{(1 - \rho^2)} \left[\left(\frac{x - m_X}{\sigma_X} \right)^2 - 2\rho \frac{x - m_X}{\sigma_X} \frac{y - m_Y}{\sigma_Y} + \left(\frac{y - m_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right]. \end{aligned}$$

4b) Die Inverse der Matrix K ist die Transponierte der Matrix der algebraischen Komplemente von K dividiert durch $\det(K)$, also wegen $\det(K) = \sigma_X^2\sigma_Y^2(1 - \rho^2)$

$$\begin{aligned} K^{-1} &= \frac{1}{\sigma_X^2\sigma_Y^2(1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_Y^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_X^2 \end{pmatrix}^T \\ &= \frac{1}{\sigma_X^2\sigma_Y^2(1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_Y^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_X^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{(1 - \rho^2)\sigma_X^2} & \frac{\rho}{(1 - \rho^2)\sigma_X\sigma_Y} \\ \frac{\rho}{(1 - \rho^2)\sigma_X\sigma_Y} & \frac{1}{(1 - \rho^2)\sigma_Y^2} \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

Es ist $\det(K) = \sigma_X^2\sigma_Y^2(1 - \rho^2)$, also gilt (für den in $p(x, y)$ auftretenden Vorfaktor)

$$\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1 - \rho^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(K)}}.$$

Voraussetzung für die Existenz von $K^{-1} = A$ ist $\det(K) \neq 0$. Diese Voraussetzung ist für $\rho^2 < 1$ erfüllt.

5) Die Zufallsgröße $(Y|X = x)$ ist gemäß Satz 14.12 nach

$$N(m_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - m_X), \sigma_Y\sqrt{1 - \rho^2}) =: N(\mu, \sigma)$$

verteilt, d.h.

$$\begin{aligned} E(Y|X = x) &= 2 + 0,6(x - 2) = 0,6x + 0,8 \\ \text{Var}(Y|X = x) &= (0,25)^2(1 - 0,36) = 0,04 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} P\{y_1 \leq Y < y_2 | X = x\} \\ = P\left\{ \frac{y_1 - E(Y|X = x)}{\sqrt{\text{Var}(Y|X = x)}} \leq \frac{(Y|X = x) - E(Y|X = x)}{\sqrt{\text{Var}(Y|X = x)}} < \frac{y_2 - E(Y|X = x)}{\sqrt{\text{Var}(Y|X = x)}} \right\}, \end{aligned}$$

wobei $\frac{Y|X=x - E(Y|X=x)}{\sqrt{\text{Var}(Y|X=x)}}$ die standardisierte Zufallsgröße von $Y|X = x$ ist. Für die Wahrscheinlichkeit ergibt sich für $\mu = 0,6x + 0,8$, $\sigma = 0,2$

$$P\{y_1 \leq Y < y_2 | X = x\} = \Phi\left(\frac{y_2 - 0,6x - 0,8}{0,2}\right) - \Phi\left(\frac{y_1 - 0,6x - 0,8}{0,2}\right).$$

Bei $y_1 = 1,9$, $y_2 = 2,1$ erhält man für $x = 1,5$

$$P\{y_1 \leq Y < y_2 | X = 1,5\} = \Phi\left(\frac{0,4}{0,2}\right) - \Phi\left(\frac{0,2}{0,2}\right) = \Phi(2) - \Phi(1) = 0,97725 - 0,841345 \approx 0,136.$$

Für $x = 2$ und $x = 2,5$ ergibt sich entsprechend

$$P\{y_1 \leq Y < y_2 | X = 2\} \approx 0,382 \quad \text{und} \quad P\{y_1 \leq Y < y_2 | X = 2,5\} \approx 0,136.$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass auf Grundstück B zwischen 1,9 und 2,1 m^3 Wasser verbraucht wird, ist (unter den 3 betrachteten Fällen $X = 1,5; 2,0; 2,5$) am größten, wenn auf Grundstück A 2 m^3 verbraucht wird. Das ist wegen $\rho = 0,6$ ganz plausibel.

Kapitel 15

1a,b) Empirische Häufigkeitsverteilung $H_n(X = i)$ und Summenhäufigkeiten s_i (empirische Wahrscheinlichkeitsverteilung $f(x)$, siehe Abb. 1)

i	n_i	$H_n(X = i)$	s_i	$P\{Y = i\} = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$
0	57	0,022	0,022	0,021
1	203	0,078	0,100	0,081
2	383	0,147	0,247	0,156
3	525	0,201	0,448	0,201
4	532	0,204	0,652	0,194
5	408	0,156	0,808	0,150
6	273	0,105	0,913	0,097
7	139	0,053	0,966	0,054
8	45	0,017	0,983	0,026
9	27	0,010	0,993	0,011
10	16	0,006	0,999	0,004
$n = 2608$		$\sum_{i=0}^{10} \frac{n_i}{n} = 0,999$		$0,995^*$

1c) Gesucht $\tilde{i}_{0,5}$ mit $\sum_{i=0}^{\tilde{i}_{0,5}} n_i = \frac{1}{2} \cdot 2608 = 1304$, was "am besten" für $\tilde{i}_{0,5} = 3$ erfüllt ist. $i_m = 4$ ist der empirische Modalwert.

1d) $\lambda = 3,87$, $P\{Y = i\}$ siehe Tabelle.

*) Die Differenz zu 1,000 hat zwei Gründe

- Rundungsfehler, aber insbesondere:

- die Ereignisse $\{X = i\}$ für $i > 10$ haben in der POISSON-Verteilung auch noch eine positive Wahrscheinlichkeit.




Abbildung 1:

Empirische Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion $f(x)$ nach (15.1) und Histogramm

1e) χ^2 -Anpassungstest

$\alpha = 0,05$ wird gewählt, Stichprobenumfang $n = 2608$, Wahl der Klassen Δ_j :

$$\Delta_0 = (\{X = 0\}), \Delta_1 = (\{X = 1\}), \dots, \Delta_{10} = (\{X \geq 10\})$$

i	n_i	p_i	$n p_i$	$\frac{(n_i - n p_i)^2}{p_i}$
0	57	0,021	54,8	230,5
1	203	0,081	211,2	830,1
2	383	0,156	406,8	3631,0
3	525	0,201	524,2	3,2
4	532	0,194	506,0	3484,5
5	408	0,150	391,2	1881,6
6	273	0,097	253,0	4123,7
7	139	0,054	140,8	60,0
8	45	0,026	67,8	19993,8
9	27	0,011	28,7	262,7
10	16	0,009	23,5	6250,0
		1,000	2608,0	40751,1

Testgröße nach (15.43):

$$t = \frac{40751,1}{2608} = 15,6 .$$

Wegen $\chi_{10;0,95}^2 = 18,31$ wird H_0 nicht abgelehnt. Das Stichprobenergebnis (i, n_i) spricht bei $\alpha = 0,05$ nicht gegen die Annahme, dass die Stichprobe aus einer POISSON-verteilten Gesamtheit stammt.

2) Mit $n = 24000$, $H_{24000}(A) = 0,5005$, $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,64$ erhält man aus (15.35), (15.36) $p_u = 0,4952$, $p_o = 0,5058$. Also ist

$$P\{0,4952 \leq p(A) \leq 0,5058\} \approx 0,90 .$$

Das gesuchte Intervall ist also $[0,4952, 0,5058]$.

3a) Schätzwerte b_0, b_1 für β_0, β_1 nach (15.53): $b_1 = 1,04$, $b_0 = 1,99$. Schätzwert s^2 für σ^2 nach (15.54): $s^2 = 0,066$.

3b) Nach (15.55) ist

$$s_0^2 = \left(\frac{1}{11} + \frac{(1,55)^2}{54,73} \right) \cdot 0,066 = 0,0089, \quad s_0 = 0,094,$$

$$s_1^2 = \frac{0,066}{54,73} = 0,0012, \quad s_1 = 0,035 .$$

Konfidenzintervalle für β_0, β_1 folgen aus (15.56) mit $t_{9;0,025} = 2,262$:

$$\beta_0 : [1,99 - 2,262 \cdot 0,094, 1,99 + 2,262 \cdot 0,094] = [1,78, 2,20]$$

$$\beta_1 : [1,04 - 2,262 \cdot 0,035, 1,04 + 2,262 \cdot 0,035] = [0,96, 1,12] .$$

3c) Hypothesentests

$H_0 : \beta_1 = 1$ gegen $H_1 : \beta_1 \neq 1$; Wegen

$$|b_1 - 1| = 0,04 < t_{9;0,025} \cdot s_1 = 2,262 \cdot 0,035 = 0,079$$

wird H_0 nicht abgelehnt.

$H_0 : \beta_0 = 2$ gegen $H_1 : \beta_0 \neq 2$; Wegen

$$|b_0 - 2| = 0,01 < t_{9;0,025} \cdot s_0 = 2,262 \cdot 0,094 = 0,21$$




Abbildung 2:
Messwerte und Regressionskurve $y = 1,99 + 1,04x$ für die Aufgabe 4

kann H_0 anhand der Stichprobe nicht abgelehnt werden.

4) Es ist

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad r^2 = \frac{[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}.$$

Mit $a_i = x_i - \bar{x}$, $b_i = y_i - \bar{y}$ folgt $r^2 \leq 1$ aus der CAUCHY-SCHWARZschen Ungleichung.

5a) Aus (15.17) folgt

$$L = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}} = 2z_{\frac{\alpha'}{2}} \frac{1}{\sqrt{2n}}, \quad z_{\frac{\alpha'}{2}} = \sqrt{2}z_{\frac{\alpha}{2}}. \quad (*)$$

Wegen $\Phi(z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ ist

$$1 - \frac{\alpha'}{2} = \Phi(z_{\frac{\alpha'}{2}}) = \Phi(\sqrt{2}z_{\frac{\alpha}{2}}) > \Phi(z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2},$$

also $\alpha' < \alpha$ und $1 - \alpha' > 1 - \alpha$; die Sicherheitswahrscheinlichkeit wächst. Bei $1 - \alpha = 0,90$ ist $\frac{\alpha}{2} = 0,05$, $z_{0,05} = 1,64$. Aus (*) ergibt sich $z_{\frac{\alpha'}{2}} = \sqrt{2}z_{0,05} = 2,32$; $\Phi(2,32) = 0,9898 = 1 - \frac{\alpha'}{2}$.

Daraus folgt $\alpha' = 0,0204$ und $1 - \alpha' \approx 0,98$.

5b) Aus (15.17) folgt: Der Stichprobenumfang muss vervierfacht werden.

Seite	Zeile	Text im Buch	zu ersetzen durch
22	10	$800 = 2^6 \cdot 5^2$	$800 = 2^5 \cdot 5^2$
39	2	...ist $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}$...ist $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}$
45	8,6 von unten	0,67474	0,67474/2 (viermal)
45	7,5 von unten	0,78086	0,94363 (zweimal)
45	7,5 von unten	0,62469	0,33101 (zweimal)
46	11 von unten	...+i sin φ)(cos ψ + i cos ψ) =...	...+i sin φ)(cos ψ + i sin ψ) =...
46	7 von unten	..cos ψ] + i[sin φ cos ψ + cos φ cos ψ]...	..sin ψ] + i[sin φ cos ψ + cos φ sin ψ]...
46	5 von unten	...- sin φ cos ψ	...- sin φ sin ψ
46	4 von unten	...+ cos φ cos ψ	...+ cos φ sin ψ
91	5 von unten	...ein ϵ_f existiert...	...ein δ_f existiert...
91	4 von unten	$ g(f(x)) - g(f(x_0)) < \epsilon_g$	$ f(x) - f(x_0) < \epsilon_f$
91	4 von unten	$ f(x) - f(x_0) < \epsilon_f$	$ g(f(x)) - g(f(x_0)) < \epsilon_g$
113	10 (in (2.23))	...(x - θ) ⁿ ,...	...(1 - θ) ⁿ ,...
115	5	$R_{2n+2}(x) = (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \cos(\theta x)$	$R_{2n+2}(x) = (-1)^n \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \sin(\theta x)$
124	13	I, das x ₀ als inneren Punkt enthält,	I ⊃ [x ₀ - r, x ₀ + r], r > 0,
125	2	mit f'(x) > 0 auf	mit f'(x) ≠ 0 auf
134	10 von unten	(0 ≤ t ≤ ∞)	(0 ≤ t < ∞)
163	10 von unten	...∑ _{k=0} ⁿ⁻¹∑ _{i=0} ⁿ⁻¹ ...
164	10 von unten	...∑ ₀ ⁿ⁻¹∑ _{i=0} ⁿ⁻¹ ...
175	10	$\int_{\epsilon}^1 t^{x-1} dx$	$\int_{\epsilon}^1 t^{x-1} dt$
175	11	$\int_0^1 t^{x-1} dx$	$\int_0^1 t^{x-1} dt$
178	8 von unten	≈ 1 · 2 + 1 · 2,5 = 4,5	≈ 2[$\frac{1}{2}$ · 1 + $\frac{1}{2}$ · 2] = 3
183	3 von unten	...Hat man z.B. die Wertetabelle... vorgegeben, also...	...Wir geben die Wertetabelle... vor, also...
184	3 (Tabelle)	...[x _{i+1} , x _i]...	...[x _{i+1} x _i]...
194	9 von unten	...(a ₀ - a ₁) + (a ₁ - a ₂) +(a ₀ - a ₁) + (a ₂ - a ₃) + ...
196	4	...Jede Reihe	...Jede konvergente Reihe
223	6	$R_{2n+2}(x) = \frac{\sin^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} x^{2n+2}$	$R_{2n+2}(x) = \frac{\sin^{(2n+3)}(\xi)}{(2n+3)!} x^{2n+3}$
223	11	... $\frac{1,2831853^{2n+2}}{(2n+2)!}$ $\frac{1,2831853^{2n+3}}{(2n+3)!}$...
223	13	$\frac{1,2831853^{2n+2}}{(2n+2)!} \approx 3,76 \cdot 10^{-10}$	$\frac{1,2831853^{2n+3}}{(2n+3)!} \approx 3,22 \cdot 10^{-11}$
223	17	... 3,76 · 10 ⁻¹⁰ berechnen kann.	...3,22 · 10 ⁻¹¹ berechnen kann (zeigen sie, dass n = 5, d.h. T ₁₂ , auch schon für eine Genauigkeit von 10 ⁻⁸ gereicht hätte).
223	20	...Potenz 1,2831853 ²ⁿ⁺²Potenz 1,2831853 ²ⁿ⁺³ ...
223	21	...als 5 ²ⁿ⁺²als 5 ²ⁿ⁺³ ...
250	10	Gleichung (3.91) und...	Gleichung (3.92) und...
251	5	a ₀ = $\frac{1}{\pi}$...	a ₀ ≈ a ₀ [*] = $\frac{1}{\pi}$...
251	7	$\frac{k}{2} a_0 = y_0 + y_1 + \dots$	$\frac{k}{2} a_0^* = y_0 + y_1 + \dots$
258	11	$c = \dots = \begin{pmatrix} -43200 - 1800i \\ 27000 + 1500i \\ 23100 + 45600i \\ -44400 - 13500i \\ -31200i \\ 42000 + 25800i \end{pmatrix}$	$c = \dots = \begin{pmatrix} 750 + 4400i \\ -3552,7 + 4194,1i \\ -7682,5 - 11524i \\ -7450 - 200i \\ -36868 - 525,7i \\ 11603 + 1855,9i \end{pmatrix}$
327	15	muss e _j ≠ 0...	muss b _j ≠ 0...
336	8 von unten	...Da Eigenwerte nur...	...Da Eigenvektoren nur...
562	14	...Ergebnis (7.16) wird...	...Ergebnis (7.17) wird...
645	3 von unten	... - cβ _n sin ... + cβ _n cos - ca _n β _n sin ... + cb _n β _n cos ...
657	14	= ...	+ ...
782	11 von unten	...Bedingung f'[x]h = 0	...Bedingung f'[x](h) = 0
786	3 von unten	...f''[u ₀](h, h) > 0	...f''[u ₀](h, h) > σ h _X ² mit einem σ > 0,
787	13	...f''[x ₀](h, h) > 0...	...f''[x ₀](h, h) > σ h ² mit einem σ > 0...
787	13 von unten	...f''[u ₀](h, h) ≤ 0...f''[u ₀](h, h) < 0...	...f''[u ₀](h, h) ≤ σ h _X ² ...f''[u ₀](h, h) < σ h _X ² ...
897	2	...Ungleichung (13.42)...	...Ungleichung (14.43)...