Vorlesung: Analysis I für Ingenieure

Michael Karow

Thema: Hyperbelfunktionen und Areafunktionen

Die Hyperbelfunktionen I

Definitionen von Cosinus hyperbolicus, Sinus hyperbolicus und Tangens hyperbolicus:

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Ableitungen:

$$\cosh'(x) = \sinh(x), \quad \sinh'(x) = \cosh(x), \quad \tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x) = 1/\cosh^2(x)$$

Die Hyperbelfunktionen II

Sei $\{(x, y(x)) \mid x \in [a, b]\}$ die Lage eines hängenden **idealen Seils** welches an seinen Endpunkten befestigt ist. Dann erfüllt die Funktion $x \mapsto y(x)$ die Differentialgleichung

$$y''(x) = c \sqrt{1 + (y'(x))^2}, \quad c > 0$$

Die Lösungen dieser DGL sind

$$y(x) = \frac{1}{c} \cosh(c(x - x_0)) + h \quad (*)$$

Ein ideales Seil hat keine Biegesteifigkeit. Diese Eigenschaft wird näherungsweise durch eine Kette mit vielen kleinen Kettengliedern realisiert. Aus diesem Grund nennt man die Graphen der Funktionen (*) **Kettenlinien**.

Die Parameter c , x_0 und h hängen von der Länge und den Aufhängepunkten des Seils ab.

Die Hyperbelfunktionen III (Vergleich mit Winkelfunktionen)

Es gilt für alle $t \in \mathbb{R}$: $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$ und $\cosh^2(t) - \sinh^2(t) = 1$.

$$\begin{aligned} \text{Einheitskreis} &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \} \\ &= \{ (\cos(t), \sin(t)) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R} \} \quad \text{Parameter } t = \pm \text{Bogenlänge} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rechter Ast der Einheitshyperbel} &= \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 1, x > 0 \} \\ &= \{ (\cosh(t), \sinh(t)) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R} \} \\ &\quad \text{Parameter } t = \pm \text{Flächeninhalt} \end{aligned}$$

Areafunktionen I

Problem: Finde zu dem Punkt $(x, y) = (\cosh(t), \sinh(t))$ auf dem rechten Ast der Einheitshyperbel den zugehörigen Flächeninhalt t .

Umformulierung: Finde t , so dass $\sinh(t) = y$. Lösung:

$$\begin{aligned}\sinh(t) = x &\Leftrightarrow \frac{e^t - e^{-t}}{2} = y \\ &\Leftrightarrow e^t \frac{e^t - e^{-t}}{2} = e^t y \\ &\Leftrightarrow (e^t)^2 - 2y e^t - 1 = 0 \quad (\text{quadratische Gleichung für } e^t) \\ &\Leftrightarrow e^t = y + \sqrt{y^2 + 1} \quad \text{oder} \quad \underbrace{e^t}_{>0} = \underbrace{y - \sqrt{y^2 + 1}}_{<0} \\ &\Leftrightarrow e^t = y + \sqrt{y^2 + 1} \\ &\Leftrightarrow t = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}).\end{aligned}$$

Die motiviert die Definition der Funktion **Areasinus** (Area=Fläche(ninhalt)):

$$\text{Arsinh}(y) := \text{Lösung } t \text{ der Gleichung } ' \sinh(t) = y ' = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}).$$

Areafunktionen II

$\text{Arsinh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist die Umkehrfunktion von $\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, d.h. es ist stets

$$\text{Arsinh}(\sinh(t)) = t, \quad \sinh(\text{Arsinh}(y)) = y.$$

Den Graphen von Arsinh erhält man durch Spiegelung des Graphen von $\sinh$ an der Diagonale:

Areafunktionen III

Berechnung der Ableitung von **Arsinh**:

Allgemeine Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion: $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$.

Für $f = \sinh$, $f^{-1} = \text{Arsinh}$ folgt

$$\begin{aligned}\text{Arsinh}'(y) &= \frac{1}{\sinh'(\text{Arsinh}(y))} \\ &= \frac{1}{\cosh(\text{Arsinh}(y))} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh^2(\text{Arsinh}(y))}} \quad \left(\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1, \cosh(z) > 0 \Rightarrow \right. \\ &\quad \left. \cosh(z) = \sqrt{1 + \sinh^2(z)} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \sinh(\text{Arsinh}(y)) \cosh(\text{Arsinh}(y))}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}\end{aligned}$$

Vergleiche mit der Ableitung von Arcussinus: $\arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$.

Areafunktionen IV

Arcosh und Artanh sind die Umkehrfunktionen von cosh und tanh.

Formeln:

$$\operatorname{Arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad (x \geq 1),$$

$$\operatorname{Artanh}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad (|x| < 1)$$

Mehr Infos dazu im Skript und in Formelsammlungen (z.B. Bronstein)