Vorlesung Variationsrechnung und optimale Steuerung

2. Foliensatz, Version vom 1.7.2014

Michael Karow

Die Eckenbedingungen I

Wir untersuchen den Fall, dass eine Extremale x an der Stelle t eine Ecke hat, d.h.

$$\dot{x}(t-) \neq \dot{x}(t+).$$

Aus den Euler-Lagrangeschen Gleichungen in Integralform

$$f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) = \int_a^t f_x(s, x(s), \dot{x}(s)) ds + c,$$

$$f(t, x(t), \dot{x}(t)) - f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t)) \dot{x}(t) = \int_a^t f_t(s, x(s), \dot{x}(s)) ds + c$$

folgen wegen der Stetigkeit der Integrale die

Weierstraß-Erdmannschen Eckenbedingungen:

$$f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-)) = f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t+)),$$

$$f(t, x(t), \dot{x}(t-)) - f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-)) \dot{x}(t-) = f(t, x(t), \dot{x}(t+)) - f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t+)) \dot{x}(t+).$$

Die Eckenbedingungen II

Um aus den Eckenbedingungen weitere Folgerungen zu ziehen, führen wir zusätzliche Notationen ein:

$$G(u) := f(t, x(t), u)$$

$$E^-(u) := E_f(t, x(t), \dot{x}(t-), u)$$

$$E^+(u) := E_f(t, x(t), \dot{x}(t+), u)$$

$$T^-(u) := f(t, x(t), \dot{x}(t-)) + f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-))(u - \dot{x}(t-))$$

$$T^+(u) := f(t, x(t), \dot{x}(t+)) + f_{\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t+))(u - \dot{x}(t+))$$

Nach Definition der Exzess-Funktion haben wir die Taylor-Entwicklungen von G :

$$G(u) = T^-(u) + E^-(u) \quad \text{Taylor-Entwicklung um } \dot{x}(t-) \text{ mit Rest } E^-$$

$$G(u) = T^+(u) + E^+(u) \quad \text{Taylor-Entwicklung um } \dot{x}(t+) \text{ mit Rest } E^+$$

Beachte, dass $T^-(\dot{x}-) = G(\dot{x}-)$ und $T^-(\dot{x}+) = G(\dot{x}+)$, und daher

$$E^-(\dot{x}-) = 0, \quad E^+(\dot{x}+) = 0.$$

Nach dem Weierstraß-Kriterium ist $E^-(u) \geq 0$ und $E^+(u) \geq 0$ für alle u .

Aus den Eckenbedingungen folgt sofort, dass die Taylor-Entwicklungen identisch sind:

$$T^-(u) = T^+(u) \quad \text{und daher auch} \quad E^-(u) = E^+(u)$$

Die Situation ist im Bild oben illustriert.

Die 2. Ableitung nach $\dot{x}$

Erinnerung:

$$f_{\dot{x}\dot{x}} = \begin{bmatrix} f_{\dot{x}_1\dot{x}_1} & \cdots & f_{\dot{x}_1\dot{x}_n} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{\dot{x}_n\dot{x}_1} & \cdots & f_{\dot{x}_n\dot{x}_n} \end{bmatrix}, \quad f_{\dot{x}_i\dot{x}_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i}.$$

Im folgenden nehmen wir an, dass die Einträge von $f_{\dot{x}\dot{x}}$ stetig von allen Variablen abhängen. Dann ist $f_{\dot{x}\dot{x}}$ symmetrisch (Satz von Schwartz).

Lemma: Sei $x \in \mathcal{PC}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$. Wenn die Strecke $(t, x(t), u_0, u_0 + s v)$, $s \in [0, 1]$, im Definitionsbereich von f enthalten ist, dann gibt es ein $\theta \in [0, 1]$ so dass

$$E_f(t, x(t), u_0, u_0 + v) = v^\top f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), u_0 + \theta v) v \quad (*)$$

Beweis: Die rechte Seite von (*) ist das Lagrange-Restglied der Taylor-Entwicklung 1. Ordnung von $u \mapsto G(u) = f(t, x(t), u)$ an der Stelle u_0 .

Hier ist ein direkter Beweis: Sei $\alpha(s) = f(t, x(t), u_0 + s v)$, $s \in [0, 1]$.

$$\begin{aligned} \alpha(1) &= \alpha(0) - \int_0^1 (-1) \dot{\alpha}(s) ds = \alpha(0) - (1-s) \dot{\alpha}(s) \Big|_{s=0}^{s=1} + \int_0^1 (1-s) \ddot{\alpha}(s) ds \\ &= \alpha(0) + \dot{\alpha}(0) + \underbrace{\int_0^1 (1-s) ds}_{=1/2} \ddot{\alpha}(\theta), \quad \theta \in [0, 1]. \end{aligned}$$

Ausrechnen der Ableitungen von α ergibt die Taylor-Entwicklung.

Die 2. Ableitung nach $\dot{x}$ und die Nichtecken-Bedingung

Satz: Sei $x \in \mathcal{PC}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ Extremale für f .

Wenn $f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), u)$ für alle $u \in \mathbb{R}^n$ existiert und **positiv definit** ist, dann hat x an der Stelle t **keine Ecke** (d.h. es ist $\dot{x}(t+) = \dot{x}(t-)$).

Beweis: Wir haben bereits gesehen (siehe Bild auf der vorletzten Seite), dass an einer Ecke gelten muss

$$E_f(t, x(t), \dot{x}(t+), \dot{x}(t-)) = 0. \quad (*)$$

Angenommen $\dot{x}(t+) \neq \dot{x}(t-)$. Dann ist $v := \dot{x}(t-) - \dot{x}(t+) \neq 0$ und daher

$$0 < v^\top f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t+) + \theta v) v = E_f(t, x(t), \dot{x}(t+), \dot{x}(t-))$$

wegen der Definitheit von $f_{\dot{x}\dot{x}}$. Dies widerspricht $(*)$ $\square$

Die 2. Ableitung nach $\dot{x}$ und die notwendige Bedingung von Legendre

Vorbemerkung: Die Legendre-Bedingung ist eine notwendige Bedingung für einen schwachen Minimierer. Sie ist eine Konsequenz der Weierstraß-Bedingung und leichter anzuwenden als diese.

Satz: Sei $x \in \mathcal{PC}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ ein schwacher Minimierer von $J(x) = \int_a^b f(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$. Dann sind die Matrizen

$$f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t+)) \quad \text{und} \quad f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-))$$

für jedes $t \in [a, b]$ **positiv semidefinit**.

Beweis: (für $t-$) Angenommen, $f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-))$ ist nicht positiv semidefinit. Dann gibt es ein $v \neq 0$ so dass

$$v^\top f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-)) v < 0.$$

Wegen Stetigkeit gibt es ein $\lambda > 0$, so dass

$$v^\top f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-) + \theta \lambda v) v < 0 \quad \text{für alle } \theta \in [0, 1],$$

also auch

$$(\lambda v)^\top f_{\dot{x}\dot{x}}(t, x(t), \dot{x}(t-) + \theta \lambda v) (\lambda v) < 0 \quad \text{für alle } \theta \in [0, 1].$$

Daraus folgt:

$$E_f(t, x(t), \dot{x}(t-), \dot{x}(t-) + \lambda v) < 0.$$

Dies widerspricht der Weierstraß-Bedingung. $\square$

Anwendung: die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten

Problem: $\int_a^b \sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} dt \rightarrow \min, \quad x(a) = A, x(b) = B.$

Die 2. Euler-Lagrange-Gleichung ergibt:

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} - \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{1 + \dot{x}^2(t)}} \dot{x}(t) \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \dot{x}^2(t)}} \right)$$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = \text{const} = c_1 \quad \Rightarrow \quad x(t) = c_1 t + c_2$$

Diese Rechnung gilt in jedem Intervall, in dem $\dot{x}(t)$ existiert. Für verschiedene solche Intervalle könnten die Konstanten verschieden sein. Dies würde eine Zickzacklinie bedeuten.

Wir müssen also noch Ecken ausschließen. Wir haben

$$\frac{d^2}{d\dot{x}^2} \sqrt{1 + \dot{x}^2(t)} = (1 + \dot{x}^2(t))^{-3/2} > 0.$$

Es gibt also keine Ecken und die Legendre-Bedingung ist auch erfüllt.

Die 2. Variation.

Seien $x, h \in \mathcal{PC}^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ und $J(x) = \int_a^b f(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$. Die 2. Variation on J ist

$$\delta^2 J(x, h) = \left. \frac{d^2}{d\epsilon^2} \right|_{\epsilon=0} J(x + \epsilon h) = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt,$$

wobei

$$P(t) = f_{\dot{x}\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{x}_1^2}(\xi) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{x}_1 \partial \dot{x}_n}(\xi) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{x}_n \partial \dot{x}_1}(\xi) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial \dot{x}_n^2}(\xi) \end{bmatrix}, \quad Q(t) = f_{xx}(t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\xi) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\xi) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\xi) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\xi) \end{bmatrix},$$

$$R(t) = f_{x\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial \dot{x}_1}(\xi) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial \dot{x}_n}(\xi) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial \dot{x}_1}(\xi) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial \dot{x}_n}(\xi) \end{bmatrix}, \quad \xi = (t, x(t), \dot{x}(t)).$$

Im skalaren Fall $x(t) \in \mathbb{R}$ hat man

$$\begin{aligned} \delta^2 J(x, h) &= \int_a^b f_{\dot{x}\dot{x}}(t) \dot{h}(t)^2 + 2 f_{x\dot{x}}(t) \dot{h}(t) h(t) + f_{xx}(t) h(t)^2 dt \\ &= \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{\dot{x}\dot{x}}(t) & f_{x\dot{x}}(t) \\ f_{x\dot{x}}(t) & f_{xx}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt \end{aligned}$$

Beweis: Hausaufgabe.

Taylor-Entwicklung bis zur 2. Ordnung und Folgerungen

Wenn f 3mal stetig differenzierbar ist, dann für alle $h \in \mathcal{PC}_0^1([a, b], \mathbb{R}^n)$,

$$J(x + h) = J(x) + \delta J(x, h) + \frac{1}{2} \delta^2 J(x, h) + \rho(\dot{h}) \|\dot{h}\|_2^2,$$

wobei

$$\|\dot{h}\|_2^2 = \int_a^b \|\dot{h}(t)\|_2^2 dt \quad \text{und} \quad \rho(\dot{h}) \rightarrow 0 \quad \text{für} \quad \|\dot{h}\|_\infty \rightarrow 0$$

Beweis: siehe z.B. Maccluer.

Folgerungen: Sei $\delta J(x, h) = 0$ für alle h .

Notwendig für ein schwaches Minimum:

$$\delta^2 J(x, h) \geq 0. \quad (\text{positive Semidefinitheit von } \delta^2 J(x, \cdot))$$

Hinreichend für ein schwaches Minimum:

$$\delta^2 J(x, h) \geq \gamma \|\dot{h}\|_2^2 \quad \text{für ein } \gamma > 0.$$

(gleichmäßige positive Definitheit von $\delta^2 J(x, \cdot)$)

Notwendige (aber nicht hinreichende) Bedingung für positive (Semi)definitheit

Betrachte

$$\delta^2 J(x, h) = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt \quad \text{mit } P = f_{\dot{x}\dot{x}}, Q = f_{xx}, R = f_{x\dot{x}}.$$

Wenn $\delta^2 J(x, h) \geq 0$ für alle $h \in \mathcal{PC}_0^1$, dann ist $P(t)$ positiv semidefinit für alle $t \in [a, b]$ (Legendre).

Wenn $\delta^2 J(x, h) > 0$ für alle $h \in \mathcal{PC}_0^1$, dann ist $P(t)$ positiv definit für alle $t \in [a, b]$.

Beweis: Plausibilität: Wähle h steil und schmal. Dann $\delta^2 J(x, h) \approx \int_a^b \dot{h}(t)^\top P(t) \dot{h}(t) dt$.

Das Jacobi-Kriterium für einen schwachen Minimierer

Notation und Voraussetzungen: Sei

$$\bullet \delta^2 J(x, h) = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt,$$

1-dimensionale Situation

• $P(t)$ positiv definit für alle $t \in [a, b]$,

• $U : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ die Lösung des Jacobischen Anfangswertproblems (2. Ordnung)

$$\frac{d}{dt}(P\dot{U} + RU) = R^\top \dot{U} + QU, \quad U(a) = 0, \quad \dot{U}(a) = I.$$

Definition:

$a_* > a$ heißt konjugierter Punkt zu a , wenn $U(a_*)$ singulär (skalärer Fall: $U(a_*) = 0$) ist.

Satz (Jacobi): Sei x eine Extremale für $J(x) = \int_a^b f(t, x(t), \dot{x}(t)) dt$, $x(a) = A$, $x(b) = B$.

• Wenn im Intervall $[a, b]$ kein konjugierter Punkt zu a liegt, dann ist x ein schwacher lokaler Minimierer für J .

• Wenn im Intervall $[a, b]$ ein konjugierter Punkt zu a liegt, dann ist x kein lokaler schwacher Minimierer für J .

Beweis des Jacobi-Satzes I

Lemma: Sei $P(t)$ positiv definit für alle t und sei $U : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ die Lösung des Jacobischen Anfangswertproblems (2. Ordnung)

$$\frac{d}{dt}(P\dot{U} + RU) = R^\top \dot{U} + QU, \quad U(a) = 0, \quad \dot{U}(a) = I. \quad (*)$$

Dann gilt für alle $h = Uw$, $w \in \mathcal{PC}_0^1([a, b], \mathbb{R}^n)$:

$$\int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt = \int_a^b (U\dot{w})^\top P(U\dot{w}) dt \geq 0. \quad (**)$$

Beweis. Sei q die linke Seite von (**). Direkte Rechnung:

$$q = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{w} \\ w \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} U & \dot{U} \\ 0 & U \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P & R \\ R^\top & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U & \dot{U} \\ 0 & U \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{w} \\ w \end{bmatrix} dt = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{w} \\ w \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} U^\top P U & M \\ M^\top & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{w} \\ w \end{bmatrix} dt,$$

wobei $M = U^\top(P\dot{U} + RU)$ und $N = \dot{U}^\top(P\dot{U} + RU) + U^\top(R^\top\dot{U} + QU)$.

Aus (*) folgt $\dot{M} = N$. Außerdem,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(M - M^\top) &= \dot{U}^\top(P\dot{U} + RU) - (P\dot{U} + RU)^\top \dot{U} + U^\top \frac{d}{dt}(P\dot{U} + RU) - \frac{d}{dt}(P\dot{U} + RU)^\top U \\ &= \dot{U}^\top RU - U^\top R^\top \dot{U} + U^\top (R^\top \dot{U} + QU) - (R^\top \dot{U} + QU)^\top U = 0. \end{aligned}$$

Weil $U(a) = 0$ folgt $M(t)^\top = M(t)$ für alle t . Also

$$\delta^2 J(x, Uw) = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{w} \\ w \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} U^\top P U & M \\ M & \dot{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{w} \\ w \end{bmatrix} dt = \int_a^b \dot{w}^\top U^\top P U \dot{w} + \frac{d}{dt}(w^\top M w) dt.$$

Die Randwerte von $w^\top M w$ sind 0. $\square$

Beweis des Jacobi-Satzes II

Lemma (noch einmal): Sei $P(t)$ positiv definit für alle t und sei $U : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ die Lösung des Jacobischen Anfangswertproblems (2. Ordnung)

$$\frac{d}{dt}(P\dot{U} + RU) = R^\top \dot{U} + QU, \quad U(a) = 0, \quad \dot{U}(a) = I. \quad (*)$$

Dann gilt für alle $h = Uw$, $w \in \mathcal{PC}_0^1([a, b], \mathbb{R}^n)$:

$$\int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt = \int_a^b (U\dot{w})^\top P(U\dot{w}) dt \geq 0.$$

Angenommen, es existiert kein konjugierter Punkt a_* in $[a, b]$. Dann ist $\det(U(t)) \neq 0$ für alle $[a, b]$. Wenn wir nun in der Jacobi-DGL P durch $P - \gamma I$ ersetzen, gilt für die zugehörige Lösung U_γ des Anfangswertproblems wegen Stetigkeit immer noch $\det(U_\gamma(t)) \neq 0$ für alle $[a, b]$. Daher ist die Gleichung

$$h(t) = U_\gamma(t)w(t)$$

für jedes $h \in \mathcal{PC}_0^1$ lösbar. Mit dem Lemma folgt

$$\begin{aligned} \delta^2 J(x, h) - \gamma \|\dot{h}\|_2^2 &= \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) - \gamma I & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt, \\ &= \int_a^b (U_\gamma \dot{w})^\top (P - \gamma I)(U_\gamma \dot{w}) dt \geq 0. \end{aligned}$$

Somit ist $\delta^2 J(x, \cdot)$ gleichmäßig positiv definit und das hinreichende Jacobi-Kriterium bewiesen.

Beweis des Jacobi-Satzes III

Wir beweisen das notwendige Kriterium von Jacobi. Erinnerung:

$$q(h) := \delta^2 J(x, h) = \int_a^b \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} P(t) & R(t) \\ R(t)^\top & Q(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h}(t) \\ h(t) \end{bmatrix} dt = \int_a^b (U\dot{w})^\top P(U\dot{w}) dt \geq 0. \quad (**)$$

Sei a_* ein konjugierter Punkt in $[a, b)$. Dann gibt es einen Vektor $w_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ so dass $U(a_*)w_0 = 0$. Nun sei $h \in \mathcal{PC}_0^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ definiert durch

$$h(t) = \begin{cases} U(t)w_0 & \text{für } t \in [a, a_*], \\ 0 & \text{für } t \in (a_*, b]. \end{cases}$$

Wegen (***) ist $q(h) = 0$. Wir konstruieren eine Variation ξ von h so dass $\delta q(h, \xi) < 0$. Dann ist $q(h + \epsilon \xi) < 0$ für hinreichend kleine ϵ . Letzteres bedeutet, dass die 2. Variation von J an der Stelle x nicht positiv semidefinit ist. Damit ist x kein Minimierer. Aus der Definition von U folgt für h ,

$$\frac{d}{dt}(P\dot{h} + Rh) = R^\top \dot{h} + Qh, \quad h(a) = 0, \quad \dot{h}(a) = w_0 \neq 0.$$

Weil $h(a_*) = 0$ ist $\dot{h}(a_*) \neq 0$. Anderenfalls wäre h die Nullfunktion (wegen Eindeutigkeit der Lösung eines Anfangswertproblems). Sei $\xi \in \mathcal{PC}_0^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ mit $\xi(a_*) = -\dot{h}(a_*)$ und $\xi(t) = 0$ für $t \leq a_* - \epsilon$. Dann

$$\begin{aligned} \delta q(h, \xi) &= 2 \int_{a_* - \epsilon}^{a_*} \xi^\top (P\dot{h} + Rh) + \xi^\top (Qh + R^\top \dot{h}) dt \\ &= 2 \xi^\top (P\dot{h} + Rh) \Big|_{a_* - \epsilon}^{a_*} + 2 \int_{a_* - \epsilon}^{a_*} -\xi^\top \frac{d}{dt}(P\dot{h} + Rh) + \xi^\top (Qh + R^\top \dot{h}) dt \\ &= 2\xi(a_*)^\top P(a_*)\dot{h}(a_*) = -2\dot{h}(a_*)^\top P(a_*)\dot{h}(a_*) < 0. \end{aligned}$$

Mechanik-Beispiel zu Jacobi

Seien $M, S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv definit.

Funktional: $J(x) = \frac{1}{2} \int_0^T \dot{x}^\top M \dot{x} - x^\top S x dt$

1. Variation: $\delta J(x, h) = \int_0^T \dot{x}^\top M \dot{h} - x^\top S h dt$

2. Variation: $\delta^2 J(x, h) = \int_0^T \dot{h}^\top M \dot{h} - h^\top S h dt = \int_0^T \begin{bmatrix} \dot{h} \\ h \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & -S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h} \\ h \end{bmatrix} dt$
(hängt in diesem Beispiel nicht von x ab)

E.L.-Gleichung: $M\ddot{x} = -Sx$

Jacobi-AWP: $M\dot{U} = -SU, \quad U(0) = 0, \quad \dot{U}(0) = I$

Man kann zeigen, dass die Matrix $A = M^{-1}S$ eine Basis von Eigenvektoren $V = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit positiven Eigenwerten $\omega_1^2 \geq \omega_2^2 \geq \dots \geq \omega_n^2$ hat. Sei

$$U(t) = V \operatorname{diag} \left(\frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1}, \frac{\sin(\omega_2 t)}{\omega_2}, \dots, \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n} \right) V^{-1}.$$

- Die Lösungen der E.L.-Gleichung (Extremalen) sind

$$x = \dot{U} x(0) + U \dot{x}(0), \quad x(0), \dot{x}(0) \text{ beliebig.}$$

- U löst das Jacobische Anfangwertproblem.
- Der erste zu 0 konjugierte Punkt ist $\frac{\pi}{\omega_1}$.
- Jacobi: Wenn $T < \frac{\pi}{\omega_1}$ dann ist jede Extremale lokaler Minimierer zu den jeweiligen Randwerten $x(0), x(T)$.
Wenn $\frac{\pi}{\omega_1} < T$, dann ist keine Extremale Minimierer.

Minimale Oberfläche eines Rotationskörpers I

Der Flächeninhalt der Mantelfläche eines Rotationskörpers um die t -Achse mit Querschnittsradius $x(t) > 0$ ist $2\pi J(x)$, wobei

$$J(x) = \int_a^b x(t) \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2} dt$$

Vorgegeben seien $x(a) = A$, $x(b) = B$, $A, B > 0$.

2. Euler-Lagrange-Gleichung ergibt:

$$c = f - f_{\dot{x}} \dot{x} = x \sqrt{1 + \dot{x}^2} - \frac{x\dot{x}^2}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}} = \frac{x}{\sqrt{1 + \dot{x}^2}}$$

Allgemeine Lösung:

$$x(t) = c \cosh\left(\frac{t}{c} + d\right), \quad c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad d \in \mathbb{R}.$$

Dabei wird benutzt, dass $\cosh'(z) = \sinh(z)$, $1 + \sinh(z)^2 = \cosh(z)^2$.

Die Konstanten c, d müssen an die Randbedingungen angepasst werden. Dies ist nicht immer möglich. Auf den folgenden Seiten diskutieren wir den Fall, dass $A = B$. Das Integrationsintervall $[a, b]$ wird als $[-a, a]$ gewählt. Dann ist $d = 0$.

Minimale Oberfläche eines Rotationskörpers II

Minimierungsproblem:

$$J(x) = \int_{-a}^a x(t) \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2} dt, \quad x(-a) = x(a) = A.$$

Extremalen: $x(t) = c \cosh(t/c)$.

Randbedingungen: $A = c \cosh(\pm a/c) = c \cosh(a/c)$.

Umformuliert: $\frac{A}{a} = \frac{\cosh(a/c)}{a/c} = \frac{\cosh(z)}{z}$, $z := a/c$. (*)

Die Funktion $z \mapsto \phi(z) = \frac{\cosh(z)}{z}$ hat das Minimum $\sinh(z_0)$ wobei $z_0 \tanh(z_0) = 1$.

Wenn $\frac{A}{a} < \sinh(z_0)$, dann hat (*) keine Lösung z .

Wenn $\frac{A}{a} > \sinh(z_0)$, dann hat (*) zwei Lösungen z_1, z_2 .

Im letzteren Fall gibt es 2 Extremalen, welche die Randbedingungen erfüllen.

Frage: Welche ist ein lokaler Minimierer?

Die Antwort gibt das Jacobi-Kriterium. (Nächste Seite)

Minimale Oberfläche eines Rotationskörpers III

Minimierungsproblem:

$$J(x) = \int_{-a}^a x(t) \sqrt{1 + \dot{x}(t)^2} dt, \quad x(-a) = x(a) = A.$$

Extremalen: $x(t) = c \cosh(x/c)$.

2. Variation:

$$\delta^2 J(x, h) = \int_{-a}^a \begin{bmatrix} \dot{h} \\ h \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} f_{\dot{x}\dot{x}} & f_{\dot{x}x} \\ f_{x\dot{x}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h} \\ h \end{bmatrix} dt = \int_{-a}^a \begin{bmatrix} \dot{h} \\ h \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \frac{c}{\cosh(t/c)^2} & \tanh(t/c) \\ \tanh(t/c) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{h} \\ h \end{bmatrix} dt$$

Jacobi-Anfangswertproblem:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{c}{\cosh(t/c)^2} \dot{u} + \tanh(t/c) \right) = \tanh(t/c) \dot{u}, \quad u(-a) = 0, \quad \dot{u}(-a) = 1.$$

Umgestellt:

$$\ddot{u} = 2 \frac{\tanh(t/c)}{c} \dot{u} - u/c^2$$

Numerische Lösung für die beiden Extremalen, die die Randbedingungen erfüllen:

Für die untere Extremale existiert ein konjugierter Punkt im Intervall $(-a, a]$, für die obere nicht $\Rightarrow$ die obere Extremale ist lokaler Minimierer, die untere nicht.